

Gourmandine.


VERWENDUNGSZWECK

E

Einzelhandel
Salatsorten

Mittelfrühe Speisesorte und Salatspezialität mit attraktiver, glatter Schale und angenehm vollem Geschmack.

- » Festkochend
- » Ansprechende Präsentation
- » Gute Lagereigenschaften



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Bretagne Plants
Kreuzung: CHARLOTTE x ESTIMA
Setzling: 92 F 229-11
Züchterrecht: 31-12-2032

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: rot-violett
Blütenfarbe: lila
Anzahl Beeren: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Anfang: durchschnittlich / 6
Laub - Entwicklung Ende: durchschnittlich / 7
Laub - Selektierbarkeit: durchschnittlich / 6
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenfarbe: gelb
Schalenqualität: gut / 7
Knollengröße: relativ groß / 7
Knollenform: langoval
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: relativ viele / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5

Empfindlichkeit und Qualität

Keimruhe: lang / 8
Metribuzin: leicht bis nicht empfindlich / 8
Bentazon: relativ empfindlich / 6,5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Wachstumsrisse: leicht empfindlich / 7
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: leicht empfindlich / 7

Unterwassergewicht: 354
Trockenmassegehalt: 19,4%
Trockenmasseverteilung: hervorragend / 8
Gehalt an Glykoalkaloiden: 5,2

Chipsqualität: ungeeignet / 4
Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6
Kochtyp: festkochend / A
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6



www.agrico.nl/de/gourmandine

PFLANZVORBEREITUNG

Düngung¹

Stickstoff: Standardempfehlung + 10%.

Phosphat: Standardempfehlung.

Potassium: Standardempfehlung.

¹ Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen

Pflanzgutbehandlung

Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen. Mehr als einmal abkeimen kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

30/40 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang ergibt sich keine Laubreaktion oder Ertragsverringering.

Fungizide

Es ist ein strenger Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule erforderlich.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagerung

Die optimale Lagertemperatur beträgt 4 °C. Geeignet für langfristige Lagerung.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenzen

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -

Weißer Nematoden Pa 2: - / -

Weißer Nematoden Pa 3: - / -

Krautfäule: sehr anfällig / 4,5

Knollenfäule: etwas anfällig / 6

Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: etwas anfällig / 6,5

Fusarium: etwas anfällig / 6

Erwinia: sehr anfällig / 4

Schwarze Flecken: anfällig / 5

Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6

Virus - A: kaum bis nicht anfällig / 9

Virus - X: sehr anfällig / 4

Virus - Yn: etwas anfällig / 6

Virus - Yntn: etwas anfällig / 6

Warzenkrankheit F1: resistent* / 10*

Warzenkrankheit F6: - / -

Warzenkrankheit F18: - / -

Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.