

Manitou.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een laat, roodschillig consumptieras met een goede schil en een hoge opbrengst.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede droogtetolerantie
- ▶ Brede aardappelmoeheid resistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Kruising: LAURA x MARANCA

Zaailing: MA 96-0419

Kwekersrecht: 31-12-2037

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: paars

Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6

Schilkleur: rood

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolgrootte: grof / 8

Knolvorm: lang ovaal

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5

Knolzetting: vrij hoog / 7

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5

Metribuzin: zeer gevoelig / 4

Bentazon: weinig gevoelig / 7

Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7

Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5

Rooibeschadiging: gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht: 351

Drogestofgehalte: 19,4%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 3,4

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5

Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5

Kooktype: vrij kruimig / B

Rauwverkleuring: - / -

Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/manitou

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: resistent / 9

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -