

Jolene.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een middenlaar consumptieras met een mooie huid en geschikt voor thuisfrites.

- » Licht gele vleeskleur
- » Geschikt voor diverse bereidingen
- » Goed onderwatergewicht



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: SAGITTA x AR 03-1491
Zaailing: AR 09-2556
Kwekersrecht: 31-12-2051

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaar / 6
Kiemkleur: rood
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 7
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
Bentazon: - / -
Ethyleen: - / -
Talent: - / -

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
Frietkwaliteit: goed / 7
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Gruwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/jolene

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -