


Evolution.

SEGMENT DE MARCHÉ

Traditionnelle
(consommation)

Une pomme de terre primeur de consommation avec une belle peau rouge foncé, et au rendement élevé.

- » Gros tubercules
- » Bonne tolérance à la sécheresse
- » Résistances multiples aux nématodes à kyste de la pomme de terre



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 94-0807 x AMOROSA
Numéro de clone : AR 99-0522
Droits d'obteneur : 31-12-2042

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : vert rouge
Couleur de la fleur : mauve pâle
Nombre de baies : assez faible / 5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : moyenne / 6,5

Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Couleur de la peau : rouge
Finition de la peau : lisse / 7
Taille du tubercule : gros / 8
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6
Tubérisation : assez élevée / 7
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5

Sensibilité et qualité

Dormance : courte / 4
Métribuzine : peu sensible / 7
Bentazone : peu sensible / 7
Éthylène : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

Repousse : assez sensible / 6
Crevasses : assez sensible / 6
Coups bleus : peu sensible / 7
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7

Poids sous eau : 343
Matière sèche : 18,9%
Répartition de la matière sèche : - / -
Niveau de glyco-alcaloïde : 8

Chipabilité : mauvaise / 4
Fritabilité : mauvaise / 4,5
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Grisaillement : - / -
Noircissement après cuisson : assez sensible / 6


www.agrico.nl/fr/evolution

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard - 10%.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)

35/55 mm : 30 cm (45.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.

© Agrico 2021-11



Say potato,
say **Agrico.**

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : légèrement sensible / 6

Nématode blanc Pa 2 : résistance au champ / 7

Nématode blanc Pa 3 : légèrement sensible / 5

Mildiou du feuillage : très sensible / 4

Mildiou du tubercule : peu sensible / 6

Gale commune : peu sensible / 6

Gale poudreuse : peu sensible / 6,5

Fusariose : peu sensible / 6

Erwinia : peu sensible / 6

Dartrose : peu sensible / 6

Virus du mop top : sensible / 5

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : peu sensible / 7,5

Virus - Y : peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique : peu sensible / 7

Galle verruqueuse F1 : peu sensible / 8

Galle verruqueuse F6 : résistant / 10

Galle verruqueuse F18 : - / -