

Twister.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg consumptieras, geschikt voor de gangbare en biologische teelt, met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Mooie presentatie
- » Goede bewaarbaarheid
- » Vrij vastkokend



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: G.W. te Winkel

Kruising: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Zaailing: TW 08-1507

Kwekersrecht: 31-12-2048

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd: middenvroeg / 7

Kiemkleur: rood paars

Bloemkleur: licht paars

Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5,5

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5

Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilkleur: geel

Schilhoedanigheid: goed / 7

Knolgrootte: vrij grof / 7

Knolvorm: rond ovaal

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: gemiddeld / 6

Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7

Metribuzin: zeer gevoelig / 3

Bentazon: redelijk gevoelig / 6

Ethyleen: 5% minder knollen / 4

Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8

Rooibeschaadiging: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 345

Drogestofgehalte: 19%

Drogestofverdeling: - / -

TGA-gehalte: 5,63

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4

Frietkwaliteit: niet geschikt / 5

Kooktype: vrij vastkokend / AB

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/twister

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Preventieve bespuitingen zijn niet nodig.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 6 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -