

# Alouette.

TRŽIŠNA NAMJENA

Višenamjenska srednje kasna sorta crvene boje kože, otporna na plamenjaču lišća i gomolja, prikladna za konvencionalnu i organsku proizvodnju.



Organska



Tradicionalna

Maloprodaja  
SvježaPrerada  
Pogodan

- ▶ Dobra tolerancija na nagnječenja
- ▶ Prikladan za kuhanje i pripremanje u domaćinstvu
- ▶ Dobro podnosi sušu



## KARAKTERISTIKE

### Opće karakteristike

**Uzgajivač:** Agrico Research B.V.  
**Križanje:** AR 02-139-1 x LAURA  
**Sjeme:** AR 04-3153

### Karakteristike biljke i gomolja

**Zrioba:** srednje kasna berba / 6  
**Boja klice:** crveno ljubičasta  
**Boja cvijeta:** svjetloljubičasta  
**Broj bobica:** nema / 4  
**Lisna masa - početni razvoj:** brzo / 8  
**Krajnji razvoj lisne mase:** dobro / 8  
**Lisna masa - razvrstavanje:** prosječno / 6  
**Lisna masa - čvrstoća:** sasvim čvrsto / 7,5

**Boja mesa:** žuta / 7,5  
**Boja pokožice:** crvena  
**Glatkoća pokožice:** dobar / 7  
**Krupnoća gomolja:** umjereno krupan / 7  
**Oblik gomolja:** ovalno izduženi  
**Ujednačenost oblika gomolja:** pravilan / 7  
**Tuberizacija:** prosječan / 6  
**Ujednačenost veličine gomolja:** umjereno pravilan / 6,5

### Osjetljivost i kvaliteta

**Dormantnost:** prosječna / 6  
**Metribuzin:** malo osjetljiv do neosjetljiv / 8  
**Bentazon:** malo osjetljiv / 7

**Sekundarni rast:** umjereno osjetljiv / 6,5  
**Raspuknuća gomolja:** umjereno osjetljiv / 6,5  
**Nagnječenje (unutarnje):** malo do neosjetljiv / 8  
**Oštećenje prilikom berbe:** umjereno osjetljiv / 6

**Podvodna težina:** 389  
**Postotak suhe tvari:** 21,1%  
**Raspodjela suhe tvari:** - / -  
**TGA razina:** 3,6

**Čips kvaliteta:** - / -  
**Kvaliteta prženih krumpirića:** iznadprosječan / 6,5  
**Kulinarski tip:** umjereno čvrst / AB  
**Oksidacija sirovog krumpira:** malo osjetljiv / 7  
**Promjena boje u sivo (nakon kuhanja):** malo osjetljiv / 7



# KAKO UZGOJITI

## Gnojidba<sup>1</sup>

**Dušik:** standardne preporuke + 10%.

**Fosfat:** standardne preporuke.

**Kalij:** standardne preporuke + 20%.

<sup>1</sup> Gnojidba se temelji na analizi tla

## Postupanje sa sjemenom

Poželjna je sadnja gomolja u toplo tlo zbog početnog sporog razvoja ove sorte. Pravilno naklijavanje nakon ukljanjanja prve klice može povoljno utjecati na zemetanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 20 cm (67.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Unatoč otpornosti na plamenjaču potrebno je obratiti pažnju na znakove infekcije.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

## Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



# Say potato, say Agrico.

## Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otpornost u polju / 8

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: umjereno do neosjetljiv / 9

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno do neosjetljiv / 9

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 7,5

Erwinia (crna noga): - / -

Nagnječenje: - / -

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -