

Levante.

Variété de conservation précoce, à haut rendement, présentant une belle peau jaune et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- » Tubérisation élevée
- » Belle peau
- » Bonne aptitude au stockage

SEGMENT DE MARCHÉ



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Agrico Research B.V.
Croisement : AR 01-3218 x ALMERA
Numéro de clone : AR 07-3009
Droits d'obteneur : 31-12-2048

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-tardive / 5,5
Couleur du germe : vert rouge
Couleur de la fleur : blanche
Nombre de baies : assez faible / 5,5
Feuillage - développement initial : plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : normale / 6
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la chair : jaune beurre / 6
Couleur de la peau : jaune
Finition de la peau : lisse / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : assez régulière / 6,5
Tubérisation : élevée / 8
Homogénéité de la taille : régulière / 7

Sensibilité et qualité

Dormance : moyenne / 6,5
Métribuzine : peu sensible / 7
Bentazone : peu sensible / 7
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Repousse : peu sensible / 7
Crevasses : peu sensible / 7
Coups bleus : assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte : assez sensible / 6

Poids sous eau : 365
Matière sèche : 19,9%
Répartition de la matière sèche : - / -
Niveau de glyco-alcaloïde : 4,73

Chipabilité : mauvaise / 4,5
Fritabilité : assez mauvaise / 5,5
Type de cuisson : légèrement farineuse / B
Grisaillement : sensible / 5,5
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7


www.agrico.nl/fr/levante

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/55 mm : 27 cm (49.500 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Fongicides

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



Say potato,
say **Agrico.**

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : peu à pas sensible / 8,5

Mildiou du tubercule : peu sensible / 7,5

Gale commune : sensible / 5

Gale poudreuse : peu sensible / 6,5

Fusariose : peu sensible / 6

Erwinia : - / -

Dartrose : peu sensible / 7,5

Virus du mop top : très sensible / 4,5

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : - / -

Virus - Y : peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique : peu à pas sensible / 8,5

Galle verruqueuse F1 : - / -

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -