

# Severina.

Srednje rana sorta dobrog prinosa  
sjajne teksture pokožice.

- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Čvrst pri kuhanju
- ▶ Lijep izgled pokožice

TRŽIŠNA NAMJENA



Tradicionalna



Maloprodaja  
Svježa



## KARAKTERISTIKE

### Opće karakteristike

**Uzgajivač:** Konst Research B.V.  
**Križanje:** AR 00-0093 x MARIANNE  
**Sjeme:** KO 08-1715

### Karakteristike biljke i gomolja

**Zrioba:** srednje rana berba / 7  
**Boja klice:** plavo ljubičasta  
**Boja cvijeta:** bijela  
**Broj bobica:** nema / 4  
**Lisna masa - početni razvoj:** prilično brzo / 7,5  
**Krajnji razvoj lisne mase:** sasvim dobro / 7,5  
**Lisna masa - razvrstavanje:** prosječno / 6,5  
**Lisna masa - čvrstoća:** sasvim čvrsto / 7

**Boja mesa:** svjetložuta / 6  
**Boja pokožice:** žuta  
**Glatkoća pokožice:** dobar / 7  
**Krupnoća gomolja:** krupan / 8  
**Oblik gomolja:** ovalan  
**Ujednačenost oblika gomolja:** pravilan / 7  
**Tuberizacija:** prosječan / 6  
**Ujednačenost veličine gomolja:** umjereno pravilan / 6,5

### Osjetljivost i kvaliteta

**Dormantnost:** umjereno kratka / 5  
**Metribuzin:** umjereno osjetljiv / 6  
**Bentazon:** - / -

**Sekundarni rast:** umjereno osjetljiv / 6,5  
**Raspuknuća gomolja:** umjereno osjetljiv / 6,5  
**Nagnječenje (unutarnje):** umjereno osjetljiv / 6  
**Oštećenje prilikom berbe:** umjereno osjetljiv / 6

**Podvodna težina:** 326  
**Postotak suhe tvari:** 18%  
**Raspodjela suhe tvari:** - / -  
**TGA razina:** 7,61

**Kulinarški tip:** umjereno čvrst / AB  
**Oksidacija sirovog krumpira:** - / -  
**Promjena boje u sivo (nakon kuhanja):** umjereno osjetljiv / 6



# KAKO UZGOJITI

## Gnojidba<sup>1</sup>

**Dušik:** standardne preporuke.

**Fosfat:** standardne preporuke.

**Kalij:** standardne preporuke + 25%.

<sup>1</sup> Gnojidba se temelji na analizi tla

## Postupanje sa sjemenom

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (54.000 biljaka/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću, ali rijetko utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

## Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 3,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 7,5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Erwinia (crna noga): - / -

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 6

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -