

Almera.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg, hoogopbrengend consumptieras met een heldere schil en een regelmatige sortering.

- » Grove knollen
- » Vrij vastkokende aardappel
- » Goede droogtetolerantie



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: BM 77-2102 x AR 80-031-20
Zaailing: SW 87-1037
Kwekersrecht: 31-12-2029

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: licht paars
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: grof / 8
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: - / -
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6,5
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 347
Drogestofgehalte: 19,1%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/almera

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -