ANBAU**EMPFEHLUNG**

Next Generation potential

Agostino (SW 10-1170).

Mittelspäte Speisesorte mit roter Schale und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Große Knollen**
- **Guter Knollenansatz**
- **Guter Trockenmassegehalt**

VERWENDUNGSZWECK

B **Biologisch** | T **Traditionell** | E **Einzelhandel** Frisch

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Lantmännen Seed B.V.
Kreuzung: AR 01-0451 x AR 02-3335
Setzling: SW 10-1170
Züchterrecht: Bevorstehend

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 5,5
Lichtkeim: rot
Blütenfarbe: helllila
Anzahl Beeren: keine / 4
Laub - Entwicklung Anfang: schnell / 8
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Selektierbarkeit: durchschnittlich / 6,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5

Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenfarbe: rot
Schalenqualität: gut / 7
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Knollenform: ovalrund
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ viele / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5

Empflindlichtkeit und Qualität

Keimruhe: relativ lang / 7
Metribuzin: leicht bis nicht empfindlich / 8
Bentazon: - / -
Ethylen: - / -

Durchwuchs: leicht empfindlich / 7
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7
Ernteschäden: empfindlich / 5,5

Unterwassergewicht: 387
Trockenmassegehalt: 21%
Trockenmasseverteilung: - / -
Gehalt an Glykoalkaloiden: -

Chipsqualität: ungeeignet / 5
Pommes-frites-Qualität: durchschnittlich / 6
Kochtyp: mehlig / BC
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstelt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

PFLANZVORBEREITUNG

Düngung[1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 20%. Anwendung vorzugsweise aufteilen. Zweite Behandlung kurz nach Knollenansatz.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

[1] Niveau der Düngung basiert auf den Bodenanalysen

Pflanzgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock. Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang ergibt sich keine Laubreaktion oder Ertragsverringerung.

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagerung

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 °C. Geeignet für mittelfristige Lagerung.

Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 8,5
Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 9

Schorf: anfällig / 5
Pulverschorf: - / -
Fusarium: etwas anfällig / 6
Erwinia: - / -
Schwarze Flecken: - / -
Pfropfenbildung: anfällig / 5,5

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - A: - / -
Virus - X: - / -
Virus - Yn: anfällig / 5,5
Virus - Yntn: - / -

Warzenkrankheit F1: resistent* / 10*
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -

Ergebnisse, die mit einem Stern * markiert sind, basieren auf eigenen Untersuchungen und sind nicht offiziell publiziert.

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl www.agrico.nl