

Sinora.

MARKNADSSEGMENT



Industri
Fritering, Chips

Medeltidig, högavkastande och lättodlad sort för tidig pommes eller chips.

- ▶ Tidig leverans direkt från fält
- ▶ Hög TS-halt
- ▶ Bra virusresistens



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: J. Schilt

Korsning: AGRIA x AM 70-2166

Nummersort: SI 85-0482

Förädlarrätt: 31-12-2027

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 7

Ljus groddens färg: blå-violett

Blomfärg: vit

Antal bär: ingen / 4

Blast - inledande utveckling: snabb / 8

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensharhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska tålig / 7,5

Köttfärg: ljusgul / 6,5

Skalfärg: gul

Skalfinish: genomsnittlig / 6

Knölstorlek: ganska stora / 7

Knölform: oval rund

Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6

Knölsättning: ganska hög / 7

Regelbundenhet i storleken: jämn / 7

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: genomsnittligt / 6

Metribuzin: något till inte känslig / 8

Bentazon: ganska känslig / 6,5

Etylen: - / -

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5

Mekaniska skador: mycket känslig / 4,5

Undervattenvikt: 416

Torrsubstanshalt: 22,6%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7

TGA-nivå: 8,2

Chips kvalitet: bra / 7

Friterings kvalitet: mycket bra / 7,5

Koktyp: något mjölig / B

Missfärgning efter råskalad: känslig / 5

Grå missfärgning (efter kokning): känslig / 5


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 25 %. Användning av stallgödsel är inte att rekommendera.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

En ordentlig förgröddning efter att ha tagit bort toppgrodden kan ge ett positivt resultat på knölsättningen. Att ta bort groddar mer än två gånger kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. För industri ändamål får den helst inte förvaras under 7 °C. Lämplig för leverans direkt från fält eller för korttidslagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: mottaglig / 4

Vit nematod Pa 3: mottaglig / 2

Bladmögel: mycket mottaglig / 4,5

Brunröta: mottaglig / 5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Pulverskorv: mottaglig / 5

Fusarium: något mottaglig / 6

Bakterios: något mottaglig / 6

Svartpricksjuka: - / -

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: något mottaglig / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: något till inte mottaglig / 8,5

Virus - Yn: något mottaglig / 7

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 7

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -