

Next Generation

Nofy.

Późna odmiana skrobiowa o dobrej plenności, odporna na zarazę ziemniaczaną liści i bulw.

- » Duża zawartość suchej masy
- » Dobrze się przechowuje
- » Dobra odporność na wirusy

SEGMENT RYNKU



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ogólne cechy charakterystyczne

Hodowca: AKV Langholt

Krzyżowanie: STAYER x AR 02-3921

Sadzonka: PL 08-4007

Prawa hodowcy: 31-12-2048

Cechy charakterystyczne rośliny i bulwy

Dojrzałość: późna / 5

Kolor kielków: zielono-czerwony

Kolor kwiatów: biały

Liczba jagód: powyżej średniej / 7

Liście - rozwój początkowy: dość szybki / 7,5

Liście - rozwój końcowy: dobry / 8

Liście - selektywność: dość łatwa / 7

Liście - twardość: dość mocne / 7,5

Kolor miąższu: jasnożółty / 6,5

Kolor skórki: żółty

Wygląd skórki: raczej słaby / 5

Wielkość bulwy: dość duża / 7,5

Kształt bulwy: owalno-okrągły

Regularność kształtu bulwy: dość regularne / 6,5

Zawijanie bulw: dość wysokie / 7

Regularność wielkości: dość regularne / 6,5

Wrażliwość i jakość

Okres spoczynku: dość długi / 7,5

Metrybuzyna: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Bentazon: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Etylen: 15% do 25% więcej bulw / 7

Wtórna wegetacja: dość wrażliwe / 6,5

Pęknięcia podczas wzrostu: nieznacznie wrażliwe do niewrażliwe / 8

Czarna plamistość: dość wrażliwe / 6

Uszkodzenia podczas zbioru: dość wrażliwe / 6

Ciężar pod wodą: 471

Zawartość suchej masy: 25,2%

Rozkład suchej masy: - / -

Poziom TGA: 15,37

Odmiana czipsowa: nieodpowiednia / 4,5

Odmiana frytkowa: nieodpowiednia / 4

Typ kulinarny: mączysty / BC

Przebarwienie: - / -

Szare przebarwienia (po ugotowaniu): dość wrażliwe / 6,5

JAK UPRAWIAĆ

Nawożenie¹

Azot: standardowe zalecenie + 10%.

Fosfor: standardowe zalecenie.

Potas: standardowe zalecenie + 10%.

¹ Poziom nawożenia bazuje na analizie gleby.

Zaprawianie nasion

Można sadzić bezpośrednio po wyciągnięciu z chłodni, najlepiej po krótkim szoku termicznym. Obrywanie kielków więcej niż jeden raz może mieć negatywny wpływ na regularność plonu i wielkość bulw.

Odległość rozsadzania

28/35 mm: 22-25 cm (55.000 roślin/ha)

35/55 mm: 26-28 cm (49.000 roślin/ha)

Chwasty

Standardowe zastosowanie metrybuzyny (Sencor) po wzięściu nie powoduje reakcji liści ani nie zmniejsza plonu.

Fungicydy

Pomimo odporności na zarzę ziemniaczaną należy zwracać uwagę na ewentualne infekcje.

Zbiór

Ze względu na wyniki w zakresie wrażliwości na ciemną plamistość i/lub uszkodzenia podczas zbioru, po desykcji należy poczekać co najmniej dwa tygodnie przed zbiorami.

Przechowywania

Zalecana temperatura przechowywania wynosi 5°C. Do przechowywania długoterminowego.



Say potato,
say **Agrico.**

Odporność

Mątwik ziemniaczany Ro 1/4: odporne / 9

Mątwik ziemniaczany Ro 2/3: umiarkowanie podatne / 6

Mątwik agresywny Pa 2: umiarkowanie podatne / 5

Mątwik agresywny Pa 3: podatne / 2

Zaraza ziemniaczana - liście: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Zaraza ziemniaczana - bulwy: nieznacznie podatne do niepodatne / 8,5

Parch zwykły: nieznacznie podatne / 6

Parch prószysty ziemniaka: bardzo podatne / 4,5

Fusarium: - / -

Erwinia: - / -

Antraknoza ziemniaka: nieznacznie podatne do niepodatne / 8

Nekrotyczne plamki: bardzo podatne / 4,5

Wirus - Liściozwój: - / -

Wirus - A: - / -

Wirus - X: - / -

Wirus - Yn: nieznacznie podatne / 6,5

Wirus - Yntn: nieznacznie podatne do niepodatne / 9

Rak ziemniaczany F1: - / -

Rak ziemniaczany F6: - / -

Rak ziemniaczany F18: - / -