

Een vroeg, fijnvallend, roodschillige tafel- en saladespecialiteit met een excellente smaak.

- ✓ Zeer hoge knolzetting
- ✓ Bijzonder smaak- en bereidingseigenschappen
- ✓ Goede virusresistenties



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Desmazieres
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2041
- ⦿ **Kruising:** FRANCINE x LAURA
- ⦿ **Zaailingnummer:** DM 99-063-07

## Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Salade

R

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij slap / 5,5

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	gemiddeld / 6
Knolvorm	lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	gevoelig / 5
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	5% minder tot 5% meer knollen / 5
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	gevoelig / 5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	391
Drogestofgehalte	21,3%
Drogestof verdeling	uitstekend / 8
TGA - gehalte	5,5

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	weinig vatbaar* / 6*
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

30/50: 20 cm (67000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft vaak een loofreactie en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Cerisa zeer vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Cerisa weinig gevoelig is voor stootblauw en rooibeschatiging.

## Bewaring

Cerisa heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

\* Resultaten met een sterretje (\*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)

