

Next Generation

Nofy.

Een laat zetmeelras met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- » Hoog onderwatergewicht
- » Geschikt voor lange bewaring
- » Goede virusresistenties

MARKTSEGMENT



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: AKV Langholt
 Kruising: STAYER x AR 02-3921
 Zaailing: PL 08-4007
 Kwekersrecht: 31-12-2048

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5
 Kiemkleur: groen rood
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 7
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: matig / 5
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5
 Knolvorm: ovaal rond
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij lang / 7,5
 Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
 Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
 Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
 Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 471
 Drogestofgehalte: 25,2%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 15,37

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Kooktype: kruimig / BC
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/nofy

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22-25cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 26-28cm (49.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels


Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Pa 2: weinig vatbaar / 5

Aardappelmoeheid Pa 3: vatbaar / 2

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: - / -

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -