

Meryem.

MARKTSEGMENT



Een laat rijpend, hoogopbrengend ras met een opvallende mooie rode schil.

- ▶ Goede droogtetolerantie
- ▶ Goede knolzetting
- ▶ Goede virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: LUSA x AR 01-0420
 Zaailing: AR 08-4009
 Kwekersrecht: 31-12-2049

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 5
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5
 Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: vrij makkelijk / 7
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
 Schilkleur: rood
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
 Knolgrootte: vrij grof / 7,5
 Knolvorm: lang ovaal
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: kort / 4
 Metribuzin: weinig gevoelig / 7,5
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% minder knollen / 4

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 349
 Drogestofgehalte: 19,2%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 3,3

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 Kooktype: vrij kruimig / B
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/meryem

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor korte tot middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: weinig tot niet vatbaar / 9

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -