

2025
2026

variedades.

“STRONGER
BY NATURE”

Say potato,
say **Agrico.**



Stronger by Nature

O cultivo da batata enfrenta grandes desafios globais. As alterações climáticas, leis e regulamentos em constante evolução e a crescente procura por práticas agrícolas sustentáveis exigem variedades que se destaquem tanto em termos de resistência como em fiabilidade.

Com o nosso tema “Stronger by Nature” (Mais fortes por natureza), sublinhamos o compromisso da Agrico em enfrentar esses desafios de frente, com variedades inovadoras que são naturalmente resistentes: preparadas para o futuro e orientadas para o desempenho. Baixo investimento, alto rendimento.

A cornerstone of this vision is our Next Generation varieties. These varieties offer natural resistance to late blight and have proven their value in recent years across both organic and conventional potato cultivation. Their resistance reduces growers’ reliance on crop protection products, lowers cultivation costs, and increases yields. In doing so, our Next Generation varieties make a direct contribution to more sustainable potato farming.

A pedra angular desta visão são as nossas variedades Next Generation. Estas variedades oferecem resistência natural ao míldio e provaram o seu valor nos últimos anos, tanto no cultivo biológico como no convencional. A sua resistência reduz a dependência dos produtores em relação aos produtos fitossanitários, diminui os custos de cultivo e aumenta os rendimentos. Ao fazê-lo, as nossas variedades Next Generation contribuem diretamente para um cultivo mais sustentável da batata.

O próximo passo nesta evolução é o melhoramento de variedades com genes de resistência combinados. Isso envolve a combinação de vários genes de resistência numa única variedade, permitindo que a planta se defenda de forma ainda mais eficaz contra o míldio. Ao combinar cuidadosamente esses genes, criamos um mecanismo de defesa mais sustentável, reduzindo significativamente o risco de propagação da doença. Esta abordagem já é um foco central dos nossos programas de melhoramento vegetal. Com a ajuda das tecnologias modernas e extensos ensaios de campo, estamos a selecionar as plântulas mais promissoras. Passo a passo, estamos a cultivar novas variedades de batata com proteção mais ampla e sustentável contra o míldio.

Para reforçar ainda mais este progresso, estamos a introduzir este ano um logótipo renovado para a Next Generation. Esta identidade atualizada reflete a evolução da marca, tornando-a reconhecível como um símbolo de inovação, fiabilidade e sustentabilidade no nosso portfólio de variedades. Mas a nossa visão vai para além da resistência. Desenvolvemos variedades que são naturalmente mais fortes – resistentes a nemátodes e vírus, com excelente conservação. Isto dá

aos produtores maior tranquilidade: rendimentos mais elevados, qualidade mais consistente e maior segurança de rendimentos. Estas são variedades preparadas para o futuro, equipadas para se destacarem num mundo em mudança.

A par destas inovações, também valorizamos os nossos clássicos. Com o lançamento do selo de qualidade Agrico Originals, destacamos variedades que já provaram o seu valor. Pense em ícones como Agria, Fontane, Markies e Sinora – variedades que causaram impacto global e constituem uma base sólida no nosso portfólio diversificado de variedades.

Desta forma, combinamos o melhor dos dois mundos: as nossas variedades inovadoras e as nossas confiáveis Agrico Originals, que demonstraram a sua força na prática durante décadas. Esta poderosa combinação é a base de um portfólio de variedades fortes e preparadas para o futuro, permitindo-nos fornecer aos nossos membros, produtores e clientes em todo o mundo exatamente as variedades de que precisam – especialmente num mercado que continua a evoluir a um ritmo acelerado.

Para manter a nossa vantagem neste cenário em mudança, estamos a fazer um investimento significativo na expansão das nossas instalações de melhoramento vegetal, a Agrico Research. Este desenvolvimento moderno apoia a nossa ambição de continuar a dar passos ousados no desenvolvimento de variedades inovadoras, equipadas para responder aos desafios atuais e futuros.

Com as tecnologias mais recentes, podemos trabalhar de forma mais rápida e eficiente para desenvolver variedades de batata robustas com as características certas: saudáveis, sustentáveis e perfeitamente adequadas às condições do mundo real. Isto permite-nos responder de forma mais eficaz aos desafios atuais, tanto no cultivo como no mercado.

Estamos orgulhosos do que alcançámos em conjunto com os nossos membros e parceiros, e olhamos para o futuro com confiança. Com variedades fortes, produtores fortes e parcerias fortes, estamos a construir um futuro em que o cultivo mundial da batata seja ainda mais forte – *por natureza*. ■



Mark Zuidhof
Diretor-geral

Ordem dos capítulos.



2	Prefácio	24	Nossas variedades	70	Legenda
4	Stronger by Nature	54	Próximos clones	74	Termos técnicos
10	Novidades 2025	62	Variedades com licença		
16	Variedades em destaque	64	Índice		

Isenção de responsabilidade

A Agrico tomou todos os cuidados na elaboração da descrição desta variedade. No entanto, toda a informação pode estar sujeita a alterações e a Agrico não se responsabiliza por erros ou omissões. A Agrico não se responsabiliza por danos relacionados com as informações contidas nesta descrição.

STRONGER BY NATURE

O setor agrícola enfrenta grandes desafios. As alterações climáticas, leis e regulamentos mais rigorosos, mudanças nas exigências do mercado e o aumento da pressão social impõem exigências significativas aos nossos produtores, compradores e parceiros. Em tempos como estes, há uma necessidade clara de certeza e confiança: variedades de batata que possam resistir à imprevisibilidade da natureza, proporcionando ao mesmo tempo rendimentos elevados, excelente qualidade e retornos estáveis. ▶▶

O tema **Stronger by Nature** (Mais fortes por natureza) capta perfeitamente o que a Agrico representa: extrair força da própria natureza. Através da Agrico Research, desenvolvemos variedades que são naturalmente resilientes e preparadas para o futuro, graças às suas características genéticas. O nosso melhoramento vegetal baseia-se em métodos naturais de cruzamento, resultando em variedades equipadas para enfrentar os desafios atuais e futuros.

A par do nosso forte portfólio Next Generation, conhecido pela sua excelente resistência ao míldio, a Agrico também oferece variedades que se destacam noutras áreas. Através do cruzamento natural, desenvolvemos batatas com resistência intrínseca e robusta a doenças, baixas necessidades de recursos produtivos e rendimentos elevados. O nosso portfólio oferece certezas onde é mais importante: rendimento, qualidade e rentabilidade. Seja resistência a nemátodes e vírus ou excelente conservação, a Agrico oferece sempre a variedade certa para cada condição de cultivo.

Com o tema **Stronger by Nature**, demonstramos não só o poder da nossa genética, mas também a versatilidade do nosso portfólio. Cada uma das

nossas variedades contribui à sua maneira para uma cultura de batata saudável, rentável e sustentável.

Força genética sustentável

À medida que os desafios no cultivo da batata continuam a crescer, também cresce a nossa ambição de fornecer as soluções certas, onde quer que sejam necessárias no mundo. Focamo-nos no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Investimos em variedades resistentes a doenças e pragas, como nemátodes, vírus e míldio, bem como em variedades com excelente conservação para garantir qualidade e disponibilidade.

Inovação em harmonia com a natureza

O trabalho de melhoramento vegetal na Agrico Research envolve mais do que as técnicas que utilizamos — é uma parceria com a natureza. Fazemos seleções com base no melhor que a

natureza oferece, combinando características desejáveis nas nossas variedades. As nossas inovações estão enraizadas em processos naturais e são sempre desenvolvidas com respeito pelas pessoas e pelo ambiente.

Certeza para o futuro

O nosso portfólio oferece certezas onde é mais necessário. Com o tema Stronger by Nature, mostramos como a inovação e a natureza podem reforçar-se mutuamente. As nossas variedades são o resultado de anos de dedicação e de uma visão de futuro. São desenvolvidas para responder aos desafios atuais e futuros, dando aos produtores e compradores confiança em variedades preparadas para o futuro. Juntamente com os nossos membros, clientes e parceiros, estamos a construir um futuro sustentável, saudável e rentável para o setor da batata – hoje e para as gerações vindouras. ■



COM UM FOCO CLARO EM

Desenvolvido através de métodos de melhoramento natural para oferecer variedades com elevado rendimento e qualidade superior. Isso contribui para a segurança de rendimentos e segurança alimentar.



RESISTÊNCIA A NEMÁTODES

Solos saudáveis, plantas fortes, rendimentos fiáveis

Para uma gestão sustentável do solo, a resistência a nemátodes é essencial. Não se trata apenas de matéria orgânica e retenção de água, mas também de manter os campos livres de doenças. À medida que o cultivo profissional da batata se concentra em zonas específicas com rotações mais intensivas, uma forte resistência a nemátodes é crucial. Proteger o solo garante rendimentos fiáveis e um cultivo de batata sustentável a longo prazo.

Lugano. 

Grande, amarela e fritástica!



RESISTÊNCIA A VÍRUS

Força genética para uma qualidade fiável com menos recursos produtivos

A produção das batatas de semente mais saudáveis possíveis com uma utilização mínima de produtos fitossanitários começa com uma forte resistência a vírus. Uma forte resistência a vírus reduz a necessidade de produtos fitossanitários e mantém o risco de infeção o mais baixo possível. É uma forma inovadora de proteger tanto a sua cultura como o ambiente, garantindo ao mesmo tempo um rendimento elevado e uma qualidade fiável.

Napoleon. 

Batata fiável para batatas fritas em rodelas de alta qualidade



EXCELENTE CONSERVAÇÃO

Batatas fortes com excelente conservação para garantir a qualidade e a disponibilidade

A boa conservação mantém as suas batatas disponíveis durante todo o ano, assegurando a alta qualidade. Prolonga os períodos de entrega, reduz os custos de armazenamento e garante um fornecimento fiável. Uma boa conservação também significa menos perdas de armazenamento, o que, em última análise, reduz a perda de rendimento e resulta num melhor retorno.

Armedi. 

Perfeição duradoura: mantém a qualidade durante o armazenamento!



RESISTÊNCIA NATURAL AO MÍLDIO

Next Generation: a melhor defesa contra o míldio

As nossas variedades Next Generation têm resistência natural ao míldio (causado pelo fungo *Phytophthora infestans*). Isso mantém as nossas batatas livres de míldio por um período mais longo após a plantação, contribuindo para a segurança dos rendimentos. Além disso, ajuda a economizar nos produtos fitossanitários.

Levante. 

Quantidade e qualidade, elevado rendimento e excelente aspeto!



Novas!

Novas variedades

Temos o orgulho de apresentar as nossas duas mais recentes variedades: Chester (AR 13-2694) e Sivas (KO 13-2242). Ambas receberam recentemente a aprovação oficial para comercialização. Após um longo período de ensaios de campo, ambas as variedades estão agora oficialmente incluídas na “Lista de variedades nacionais de 2025” e podem ser comercializadas sob o seu nome exclusivo. ▶▶

Chester

(AR 13-2694).



Variedade semiprecoce para a indústria de chips, resistente à G. Pallida, uniforme em calibre, bom teor de matéria seca e boa tolerância ao azulamento.

- ▶ Alto rendimento e boa tuberização
- ▶ Boa qualidade de fritura mesmo após longo período de armazenamento
- ▶ Apropriada para flocos

Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: AR 07-4052 x ALICANTE

Clone: AR 13-2694

Direito do obtentor: Pendente



Chester (AR 13-2694) é uma nova e promissora variedade para fritura em rodelas do programa de melhoramento da Agrico Research. A variedade é o resultado de um cruzamento entre a AR 07-4052 e a Alicante e destaca-se pelos tubérculos de calibre uniforme, rendimentos elevados e excelente qualidade de processamento.

O mais notável é a combinação entre precocidade e elevado rendimento. A Chester (AR 13-2694) produz um elevado número de tubérculos uniformes, redondos ovais, com polpa amarela clara.

Esta variedade é particularmente atrativa para a indústria de processamento, devido ao seu alto teor de matéria seca (24%) e excelente qualidade de fritura em rodelas, que é mantida mesmo após o armazenamento. Isto torna-a altamente adequada tanto para a produção de batatas fritas em rodelas como de flocos. A combinação da adequação tanto para batatas fritas em rodelas como para flocos aumenta a versatilidade geral desta variedade.

A Chester (AR 13-2694) é parcialmente resistente a Pallida 2 e a Pallida 3 (7/7). Apesar do seu elevado teor de matéria seca, a variedade apresenta uma suscetibilidade limitada a manchas negras.

Em suma, a Chester (AR 13-2694) combina fortes características de cultivo, elevados rendimentos e excelente qualidade de fritura em rodelas. Isso significa que esta variedade é uma valiosa adição ao segmento das batatas fritas em rodelas, com forte potencial tanto para o cultivo como para o processamento.

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6

Brolho de cor clara: -

Cor da flor: branca

Número de bagas: - / -

Folhagem - desenvolvimento inicial: rápido / 8

Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8

Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7

Forma dos tubérculos: oval redonda

Regularidade da forma: bastante regular / 6,5

Tuberização: média / 6,5

Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5

Dormência: média a curta / 5

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6

Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5

Rachamentos: ligeiramente sensível / 7

Danos mecânicos: sensível / 5

Metribuzin pre-emergencia: sensível / 5

Metribuzin post-emergencia: moderadamente sensível / 6,5

Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão + 10%.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

30/40 mm: 25-27 cm (51.000 plantas/ha)

40/50 mm: 30-32 cm (43.000 plantas/ha)

50/60 mm: 35 cm (38.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior 9 °C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

agricopotatoes.pt/chester

Peso debaixo de água: 446

Teor de matéria seca: 24%%

Grupo culinário: farinhenta / C

Descoloração após cozedura: ligeiramente sensível / 7

Descoloração em cru: muito sensível / 4,5

Qualidade para fritura em palitos: - / -

Distribuição da matéria seca: média / 6

Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7

Nível TGA: 10,9

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -

Vírus Yn: ligeiramente sensível / 6

Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente sensível a não sensível / 8

TRV: suscetível / 5

Míldio da folha: suscetível / 5

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: suscetível / 5

Sarna comum: suscetível / 5,5

Sarna pulverulenta: - / -

Antracnose: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: moderadamente suscetível* / 5*

Nemátode dourado Ro 2/3: moderadamente suscetível / 5

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo* / 7*

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo* / 7*

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: - / -

Verruga negra F18: - / -

* Results marked with an (*) are based on our own research and have not yet been officially published.

Say potato,
say **Agrico.**



Sivas

(KO 13-2242).



Tradicional

Variedade semitardia de grandes tubérculos ovais, boa dormência e boa tolerância ao azulamento.

- ▶ Alto rendimento
- ▶ Boa resistência aos vírus e sarna
- ▶ Bonito acabamento de pele

Características Gerais

Obtentor: Konst Research B.V.

Cruzamento: KO 06-1457 x SAVANNA

Clone: KO 13-2242

Direito do obtentor: Pendente



Sivas é a novidade deste ano no segmento tradicional. Trata-se de uma variedade obtida pela Konst Research B.V., como resultado de um cruzamento entre a KO 06-1457 e a Savanna. A variedade destaca-se pelos seus tubérculos grandes e ovais, pele atrativa e excelente conservação.

Esta variedade combina um forte vigor de crescimento, desenvolvimento robusto da folhagem e um rendimento elevado e fiável. Produz tubérculos grandes e uniformes com pele amarela e polpa amarela clara. Graças ao seu longo período de dormência, a Sivas (KO 13-2242) é muito adequada para armazenamento a longo prazo.

Em termos de qualidade culinária, a Sivas (KO 13-2242) é uma variedade de polpa firme após a cozedura, com um peso médio de água (350) e um teor de matéria seca de 19,2 %. Estas características tornam a variedade ideal para o mercado tradicional local, onde o seu aspeto atrativo e elevado rendimento são fatores-chave.

A Sivas (KO 13-2242) também oferece uma forte resistência a doenças. É resistente aos nemátodos dourados Ro 1/4 e à verruga negra F1, apresentando também uma boa tolerância à sarna comum.

Com o seu elevado rendimento, excelente resistência e aspeto atrativo, a Sivas (KO 13-2242) tem todas as qualidades necessárias para se tornar uma variedade de exportação de sucesso!

CARACTERÍSTICAS

Plant and tuber characteristics

Maturity: early maincrop / 5,5

Light sprout colour: -

Flower colour: white

Number of berries: average / 6

Foliage - initial development: quite fast / 7,5

Foliage - final development: good / 8

Foliage - firmness: firm / 8

Skin colour: yellow

Flesh colour: light yellow / 6

Skin finish: above average / 6,5

Tuber shape: oval

Regularity of tuber shape: quite regular / 6,5

Tuberisation: quite low / 5,5

Tuber size: large / 8

Regularity of tuber size: regular / 7

Dormancy: quite long / 7,5

Sensitivity and quality

Secondary growth: quite sensitive / 6,5

Black spot (internal bruising): slightly to not sensitive / 8

Growth cracks: quite sensitive / 6,5

Harvest damage: -

Metribuzin - pre-emergence: -

Metribuzin - post-emergence: -

Ethylene: -

COMO CULTIVAR

Fertilization¹

Nitrogen: standard advice - 10%. Preferably as split application, second treatment shortly after tuberization.

Phosphate: standard advice.

Potassium: standard advice.

Seed treatment

Desprouting more than twice can have a negative impact on yield and size regularity.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Weeds

A standard use of metribuzin (Sencor), before or after emerge, doesn't give foliage reaction or yield reduction.

Fungicides

A preventive spraying schedule against late blight is advised.

Harvest

Due to its sensitivity scores for black spot and/or harvest damage, wait at least two weeks after haulm killing before harvest.

Storage

Preferred storage temperature is 4 °C. Suitable for medium term storage.



¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

agricopotatoes.pt/sivas

Underwater weight: 350

Dry matter content: 19,2%

Cooking type: firm / A

Discolouration after cooking: quite sensitive / 6

Raw discolouration: -

Fries quality: average / 6

Dry matter distribution: -

Crisping quality: -

TGA - level: 7,4

Resistances

Virus - Leafroll: -

Virus - Yn: slightly susceptible / 6,5

Virus - Yntn: slightly susceptible / 7

Spraying: -

Late blight - foliage: susceptible / 5,5

Late blight - tuber: slightly susceptible / 6

Fusarium: slightly susceptible / 6

Common scab: slightly susceptible / 6,5

Powdery scab: -

Black dot: -

Golden nematode Ro 1/4: resistant / 9

Golden nematode Ro 2/3: -

White nematode Pa 2: -

White nematode Pa 3: -

Wart disease F1: resistant / 10

Wart disease F6: -

Wart disease F18: -

Say potato,
say **Agrico.**



Consolidadas em todos os mercados

Each year, we select a number of varieties that deserve special attention. These 'spotlight varieties' are innovative selections that are currently making a strong impact on the market or have already established their reputation. Thanks to our wide range, this year we have chosen to highlight two varieties within the processing segment and one in the traditional segment. ▶▶



Lugano.

Variedade de indústria, semitardia, de polpa amarela e boa resistência aos nematodes dos quistos da batateira.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Múltiplas resistências
- ▶ Boa conservação

Características Gerais

Obtentor: F.J. Vos
Cruzamento: AR 00-2211 x AR 99-0669
Clone: VO 07-0289
Direito do obtentor: 31-12-2048



SPOTLIGHT
VARIETY



Indústria
Palitos



Tradicional

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 20%.
Não se recomenda a aplicação de cloreto de potássio, já que afeta o teor de matéria seca dos tubérculos.

Tratamento da semente

Pode ser plantada imediatamente após retirada da câmara de frio, de preferência após curto choque térmico. Desgrelar mais que duas vezes pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 22 cm (60.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)
50/55 mm: 36 cm (37.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 5°C. Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior a 7 °C. Adequada para períodos longos de armazenamento.



¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

agricopotatoes.pt/lugano

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 5,5
Brolho de cor clara: vermelha
Cor da flor: branca
Número de bagas: inferior à média / 7
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: média / 6
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: bastante regular / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: longa / 8

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6
Manchas negras: moderadamente sensível / 6
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: muito sensível / 4,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeiramente sensível a não sensível / 8
Metribuzin post-emergencia: ligeiramente sensível / 7,5
Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 394
Teor de matéria seca: 21,4%%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Distribuição da matéria seca: boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: inferior à média / 5,5
Nível TGA: 6,4

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: suscetível / 5,5
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível / 7,5

TRV: suscetível / 5,5
Míldio da folha: suscetível / 5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6,5
Sarna comum: suscetível / 5,5
Sarna pulverulenta: ligeiramente suscetível / 7,5
Antracnose: ligeiramente suscetível / 6

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente / 9

Say potato,
say Agrico.



Douwe Werkman
Product Manager

“Descubra o poder da Lugano, a variedade de batata que é popular devido à sua impressionante resistência aos nemátodes. Com tubérculos grandes e excelentes propriedades de processamento, a Lugano é uma ótima escolha para a indústria de batatas fritas em palitos e para os mercados tradicionais. Esta variedade, com uma planta forte, resistência aos nemátodes dos quistos da batateira e à verruga negra, além de uma excelente dormência, é uma das favoritas dos produtores e da indústria da batata. Obtenha excelentes resultados com a Lugano!”

Napoleon.

SPOTLIGHT
VARIETY



Indústria
Rodelas Flocos

Variedade tardia para fritura em rodelas (chips), com boa uniformidade de calibre e elevado teor de matéria seca.

- ▶ Boa qualidade de fritura em rodelas (chips)
- ▶ Adequada para a indústria de flocos
- ▶ Boa resistência a vírus

Características Gerais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: ANTINA x ALICANTE
Clone: AR 10-4637
Direito do obtentor: 31-12-2051



COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão - 10%.
Fósforo: conselho padrão.
Potássio: conselho padrão + 20%.

Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos.

Distância de plantação

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plantas/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 3 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

Armazenamento

Para fins industriais não armazenar a temperatura inferior 9 °C. Adequada para armazenamento de médio a longo prazo.



¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

agricopotatoes.pt/napoleon

CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: tardia / 5
Brolho de cor clara: violeta vermelha
Cor da flor: branca
Número de bagas: muito elevado / 4
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7
Folhagem - desenvolvimento final: bom / 8
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7,5

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Calibre dos tubérculos: médio a grande / 7,5
Forma dos tubérculos: redonda oval
Regularidade da forma: regular / 7
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: regular / 7
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: moderadamente sensível / 6,5
Manchas negras: sensível / 5,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6
Danos mecânicos: muito sensível / 4,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Metribuzin post-emergencia: ligeiramente sensível / 7
Etileno: 5% menos a 5% mais tubérculos / 5

Peso debaixo de água: 450
Teor de matéria seca: 24,1%%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6
Descoloração em cru: moderadamente sensível / 6
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Distribuição da matéria seca: boa / 7
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Nível TGA: 4,0

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

TRV: suscetível / 5
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Fusarium: ligeiramente suscetível / 6,5
Sarna comum: ligeiramente suscetível / 6
Sarna pulverulenta: - / -
Antracnose: ligeiramente suscetível / 6

Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: - / -
Verruga negra F18: - / -

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: - / -
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: suscetível / 4
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: suscetível / 2

Say potato,
say Agrico.



Adrie Omtzigt
Gestor de produto

“ Descubra a Napoleon, a variedade de batata excepcional para batatas fritas em rodelas de alta qualidade! Devido à sua excelente qualidade de fritura, distribuição uniforme da matéria seca e pontas açucaradas mínimas, a Napoleon fornece consistentemente um produto final excepcional. A variedade produz bons rendimentos e tubérculos de calibre muito uniforme, ideal para o segmento das batatas fritas em rodelas. Com excelente resistência a vírus e adaptabilidade a várias condições de cultivo, a Napoleon é uma variedade muito robusta. Escolher a Napoleon significa escolher qualidade e fiabilidade. ”

Paradiso.

SPOTLIGHT
VARIETY




Tradicional

Variedade semitardia, para o mercado tradicional, de tubérculos grandes e excelente rendimento.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Boa tolerância a manchas negras

Características Gerais

Obtentor: M. Pot & M. Klaver
Cruzamento: RODEO x VALOR
Clone: PK 06-0108
Direito do obtentor: 31-12-2048



CARACTERÍSTICAS

Características da planta e dos tubérculos

Maturação: semitardia / 6
Brolho de cor clara: vermelha
Cor da flor: roxa
Número de bagas: inferior à média / 6,5
Folhagem - desenvolvimento inicial: bastante rápido / 7,5
Folhagem - desenvolvimento final: bastante bom / 7,5
Firmeza da folhagem: bastante firme / 7

Cor da pele: amarela
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Calibre dos tubérculos: grande / 8
Forma dos tubérculos: oval alongada
Regularidade da forma: bastante regular / 6,5
Tuberização: média / 6
Regularidade do calibre: bastante regular / 6,5
Dormência: média / 6

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos: ligeiramente sensível / 7
Manchas negras: ligeiramente sensível / 7,5
Rachamentos: moderadamente sensível / 6,5
Danos mecânicos: moderadamente sensível / 6,5

Metribuzin pre-emergencia: ligeiramente sensível a não sensível / 8

Metribuzin post-emergencia: moderadamente sensível / 6,5

Etileno: 5% a 15% mais tubérculos / 6

Peso debaixo de água: 329
Teor de matéria seca: 18,2%%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Descoloração após cozedura: moderadamente sensível / 6,5
Descoloração em cru: - / -
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 4,5
Distribuição da matéria seca: - / -
Qualidade para fritura em rodelas: inadequada / 4
Nível TGA: 4,8

Resistências

Vírus do enrolamento: - / -
Vírus Yn: ligeiramente sensível / 6
Vírus - Yntn (tubérculo): ligeiramente sensível / 7,5

TRV: muito sensível / 4
Míldio da folha: sensível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente sensível / 6,5

COMO CULTIVAR

Fertilização¹

Azoto: conselho padrão - 20%.
Dividir a fertilização, fazendo a segunda aplicação pouco depois da tuberização.

Fósforo: conselho padrão.

Potássio: conselho padrão.

Tratamento da semente

Desgrelar pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

Distância de plantação

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantas/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 plantas/ha)

Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

Fungicidas

É aconselhável fazer um calendário de tratamentos preventivos contra o míldio.

Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

¹ O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos médios de armazenamento.



agricopotatoes.pt/paradiso



Douwe Werkman
Product Manager

“Paradiso, a batata completa! Esta variedade produz rendimentos impressionantes com um elevado número de tubérculos e também se destaca pela sua consistência. Uma planta forte significa que a Paradiso é uma escolha fiável, mesmo em zonas mais quentes. A Paradiso é sinónimo de sucesso anual, de rendimentos consistentes e de batatas bonitas. Junte-se aos clientes satisfeitos e descubra a continuidade e a qualidade que a Paradiso tem para oferecer. Obtenha certezas com a Paradiso!”

Say potato,
say Agrico.



Nossas variedades 2025/2026

Uma visão geral abrangente do nosso portfólio

Este catálogo apresenta as nossas principais variedades, organizadas por ordem alfabética. Cada variedade está marcada com um ícone codificado por cores, tornando imediatamente claro qual o mercado que melhor serve: tradicional, retalho ou indústria. Esta visão geral também apresenta diversas variedades sem licença que continuam a ser muito valorizadas e amplamente apreciadas pelos nossos clientes.

Com o novo selo de qualidade *Agrico Originals*, destacamos também variedades que há muito provaram o seu valor na prática e que transformaram permanentemente o cultivo da batata. Trata-se de verdadeiros clássicos que fizeram a diferença em todo o mundo e que constituem a base sólida do nosso vasto e diversificado portfólio de variedades. ▶▶



Biológico



Tradicional



Agrico Originals



Retalho
fresco, babies,
saladas,
especialidades



Indústria
fécula, rodela,
flocos, palitos,
refrigerados




Next Generation
Resistência natural
ao míldio

Adato.



Variedade de ciclo médio, de tubérculos bastante grandes e teor de matéria seca relativamente elevado.

- ▶ Boa qualidade da pele
- ▶ Boa tolerância à secura
- ▶ Adequada para cozer e assar no forno



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: NICOLA x RED BARON
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: cremosa / 5,5
Acabamento de pele: muito boa / 7,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso de baixo de água: 374

Teor de matéria seca: 20,4%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/adato

Agria.



Variedade tardia para a indústria, de polpa amarela, bom rendimento e de qualidade muito estável.

- ▶ Excelente qualidade de fritura
- ▶ Múltipla resistência a vírus
- ▶ Boa conservação

the ORIGINAL



Características principais

Obtentor: Böhm
Cruzamento: QUARTA x SEMLO
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: longa / 8
Peso de baixo de água: 402
Teor de matéria seca: 21,8%

Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9
Verruga negra F6: bastante suscetível / 6



agricopotatoes.pt/agria

Agata.



Variedade precoce de polpa moderadamente firme quando cozida, com uma pele lisa muito atrente e de alto rendimento.

- ▶ Tubérculos uniformes em calibre e forma
- ▶ Boa resistência a vírus
- ▶ Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: BM 72-0052 x SIRCO
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: alta / 8
Dormência: curta / 4

Peso de baixo de água: 316
Teor de matéria seca: 17,6%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/agata

Alouette.



Variedade de ciclo médio, versátil, de pele vermelha, resistente ao míldio da folha e do tubérculo e adequada para produção convencional e biológica.

- ▶ Boa tolerância a manchas negras
- ▶ Adequada para cozer e assar no forno
- ▶ Boa tolerância à secura



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 02-139-1 x LAURA
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6
Peso de baixo de água: 389
Teor de matéria seca: 21,1%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 8
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/alouette

Arizona.



Tradicional

Variedade semiprecoce de elevado rendimento nas mais variadas condições climáticas.

- ▶ Tubérculos uniformes em calibre e forma
- ▶ Boa tolerância à seca
- ▶ Múltipla resistência a vírus



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: UK 150-19D22 x MASCOTTE

Maturação: semiprecoce / 7

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: superior á média / 6,5

Tuberização: média / 6

Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 301

Teor de matéria seca: 17%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Verruga negra F1: resistente / 10

Verruga negra F6: bastante suscetível / 6



agricopotatoes.pt/arizona

Arsenal.



Indústria
Rodelas Flocos

Variedade semitardia, para fritura em rodelas (chips), com elevada resistência aos nemátodes dos quistos da batateira e um bom rendimento.

- ▶ Múltiplas resistências
- ▶ Adequada para indústria de batatas fritas em rodelas (chips) e flocos
- ▶ Elevado teor de matéria seca



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: AR 92-1146 x SILVESTER

Maturação: semitardia / 5,5

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Tuberização: média alta / 7

Dormência: média a curta / 5

Peso debaixo de água: 447

Teor de matéria seca: 24%

Grupo culinário: farinhenta / BC

Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 8

Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 8

Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/arsenal

Armedi.



Indústria
Palitos

Variedade para a indústria, semitardia, adequada para a indústria de batatas fritas em palitos.

- ▶ Boa tuberização
- ▶ Adequada para períodos longos de armazenamento
- ▶ Múltipla resistência a nemátodes dos quistos da batateira



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: TOPAS x BASIN RUSSET

Maturação: semitardia / 5,5

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: média / 6

Tuberização: média / 6,5

Dormência: média / 6,5

Peso debaixo de água: 402

Teor de matéria seca: 21,8%

Grupo culinário: farinhenta / C

Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo / 7

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5

Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente / 9

Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 8

Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/armedi

Artemis.



Tradicional



Retalho
Fresco

Variedade semiprecoce, com um excelente rendimento e perfeita para batata frita em uso doméstico.

- ▶ Excelente qualidade de fritura
- ▶ Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos
- ▶ Múltiplas resistências



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.

Cruzamento: RIANITA x RENSKA

Maturação: semiprecoce / 7

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: boa / 7

Tuberização: média alta / 7

Dormência: média a curta / 5,5

Peso debaixo de água: 375

Teor de matéria seca: 20,4%

Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B

Qualidade para fritura em palitos: média / 6

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8

Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/artemis

Babylon.



Variedade para a indústria, tardia, de polpa amarela, bom rendimento e qualidade muito estável.

- ▶ Excelente qualidade de fritura
- ▶ Múltipla resistência a vírus
- ▶ Boa conservação



Características principais

Obtentor: R.K. Bakker
Cruzamento: AGRIA MUTANT
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 401
Teor de matéria seca: 21,7%

Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo / 8
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/babylon

Carolus.



Variedade semitardia, multiusos, com olhos vermelhos atrativos e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- ▶ Variedade multiusos
- ▶ Elevado teor de matéria seca
- ▶ Polpa farinhenta



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AGRIA x AR 00-94-17
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 398

Teor de matéria seca: 21,6%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/carolus

Beyonce.



Variedade de ciclo médio para fritura em rodelas (chips), com um bom teor de matéria seca, adequada para armazenamento de médio prazo e resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa dormência
- ▶ Tuberização bastante elevada



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 94-2061 x LADY JO
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a longa / 7

Peso debaixo de água: 446
Teor de matéria seca: 23,9%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em rodelas: excelente / 8
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5



agricopotatoes.pt/beyonce

Cerisa.



Variedade precoce, para saladas, de pele vermelha, tubérculos de pequeno calibre e excelente sabor.

- ▶ Tuberização muito elevada
- ▶ Excelente sabor e propriedades culinárias
- ▶ Boa resistência a vírus



Características principais

Obtentor: Desmazières
Cruzamento: FRANCINE x LAURA
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: alta / 9

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 391
Teor de matéria seca: 21,3%
Grupo culinário: firme / A
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7



agricopotatoes.pt/cerisa

Chester

(AR 13-2694).



Variedade semiprecoce para a indústria de chips, resistente à G. Pallida, uniforme em calibre, bom teor de matéria seca e boa tolerância ao azulamento.

- ▶ Alto rendimento e boa tuberação
- ▶ Boa qualidade de fritura mesmo após longo período de armazenamento
- ▶ Adequada para flocos

Características principais

Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 07-4052 x ALICANTE
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberação: média / 6,5
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 446
Teor de matéria seca: 24%

Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo* / 7*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo* / 7*
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/chester

Corazon.



Variedade semiprecoce de pele vermelha e bom rendimento precoce.

- ▶ Excelente qualidade da pele
- ▶ Polpa bastante firme após cozedura
- ▶ Múltiplas resistências

Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: EVOLUTION x MANITOU
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberação: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 321

Teor de matéria seca: 17,8%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/corazon

Constance.



Variedade semiprecoce, com pele amarela brilhante e polpa amarela clara.

- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Tubérculos de calibre uniforme
- ▶ Polpa bastante firme após cozedura

Características principais

Obtentor: J.L. Spijkman
Cruzamento: MARABEL x AR 93-1243
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: excelente / 8

Tuberação: média / 6
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB



agricopotatoes.pt/constance

Diamant.



Variedade semitardia, versátil, com boa tolerância ao calor, elevado rendimento e adequada para batata frita em uso doméstico.

- ▶ Excelente qualidade de fritura
- ▶ Boa resistência a vírus
- ▶ Adequada para segunda cultura

Características principais

Obtentor: Precardi
Cruzamento: CARDINAL MUTANT
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberação: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5
Peso debaixo de água: 420

Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 8
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: bastante suscetível / 6



agricopotatoes.pt/diamant

Ditta.



Variedade versátil, semitardia para consumo e salada, adequada para cultivo convencional e biológico.

- ▶ Excelente qualidade de consumo
- ▶ Boa conservação
- ▶ Múltiplas resistências



Características principais

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamento: BINTJE x QUARTA
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a longa / 7

Peso debaixo de água: 369
Teor de matéria seca: 20,2%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/ditta

Esmee.



Variedade semiprecoce, com uma bonita pele vermelha, boa tolerância ao calor e bom rendimento.

- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Múltipla resistência a vírus



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LAURA x RODEO
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: média / 6

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 326
Teor de matéria seca: 18%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/esmee

Erika.



Variedade precoce de polpa firme, para os segmentos de retalho e salada, com boa resistência à sarna comum.

- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Tuberização elevada
- ▶ Boa resistência ao vírus Y



Características principais

Obtentor: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Cruzamento: MARABEL x AR 88-0156
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8

Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 337
Teor de matéria seca: 18,6%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9




agricopotatoes.pt/erika

Evolution.



Variedade semiprecoce, com uma atrativa pele vermelha escura e um bom rendimento precoce.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa tolerância à secura
- ▶ Múltipla resistência aos nemátodes dos quistos da batateira



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 94-0807 x AMOROSA
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: curta / 4
Peso debaixo de água: 343
Teor de matéria seca: 18,9%

Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: moderadamente suscetível / 6
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 7
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 8
Verruga negra F6: resistente / 10



agricopotatoes.pt/evolution

Fajah.



Tradicional

Variedade precoce, forte, com tubérculos grandes, regulares em forma e teor de matéria seca relativamente elevado.

- ▶ Tubérculos grandes e elevado rendimento
- ▶ Tubérculos ovais alongados e calibre uniforme
- ▶ Dormência curta, adequada para uma segunda cultura



Características principais

Obtentor: R. Rispens
Cruzamento: LANORMA x AMBITION
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: média / 6
Dormência: média a curta / 5,5

Peso debaixo de água: 354
Teor de matéria seca: 19,4%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5



agricopotatoes.pt/fajah

Jacky.



Biológico



Retalho
Babies



Indústria
4ª Gama



next
GENERATION

Variedade semiprecoce de pequeno calibre (babies), elevado rendimento e resistência ao míldio da folha e do tubérculo.

- ▶ Polpa moderadamente farinhenta
- ▶ Tuberização elevada
- ▶ Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: ANOUK x ATHLETE
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: alta / 9
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 368

Teor de matéria seca: 20,1%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9



agricopotatoes.pt/jacky

Fontane.



Indústria
Palitos Rodelas
Flocos



Variedade de indústria, semitardia, de elevado rendimento, para a produção de flocos e batatas fritas em palitos.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Elevado teor de matéria seca
- ▶ Adequada para diferentes tipos de solo



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: AGRIA x AR 76-034-03
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 430
Teor de matéria seca: 23,2%

Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: média / 6
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5
Verruga negra F1: bastante suscetível / 6
Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8



agricopotatoes.pt/fontane

Jolene.



Tradicional



Retalho
Fresco

Variedade de ciclo médio com um bom acabamento de pele, adequada para batata frita em uso doméstico.

- ▶ Polpa amarela clara
- ▶ Adequada para vários tipos de pratos
- ▶ Bom teor de matéria seca



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: SAGITTA x AR 03-1491
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 389
Teor de matéria seca: 21,1%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7



agricopotatoes.pt/jolene

Kuroda.



Tradicional

Variedade semitardia de pele vermelha, com excelente tolerância ao calor e muito bom rendimento.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa conservação
- ▶ Múltiplas resistências à verruga negra


Características principais

Obtentor: G. Kuik
Cruzamento: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: longa / 8
Peso abaixo de água: 426

Teor de matéria seca: 23%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: /
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/kuroda



Lugano.

Grande, amarela e fritástica!

O poder da inovação

Variedade de indústria, semitardia, de polpa amarela e boa resistência aos nematodes dos quistos da batateira.



Indústria
Palitos



Tradicional

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Múltiplas resistências
- ▶ Boa conservação

Todas as informações e dados técnicos da variedade spotlight podem ser encontrados na **página 18** ou digitalizar o código QR.



agricopotatoes.pt/lugano

Leonore (AR 13-1059).



Indústria
Palitos

Variedade para a indústria, precoce, de boa produção e bom teor de matéria seca.

- ▶ Precoce
- ▶ Boa resistência a vírus
- ▶ Tubérculos longo ovais com bom acabamento de pele


Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: EXCELLENCY x AR 06-3754
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média / 6

Peso abaixo de água: 397
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/leonore



Levante.



Variedade semitardia de elevado rendimento, com uma bonita pele amarela, resistente ao míldio da folha e do tubérculo.

- ▶ Tuberização elevada
- ▶ Bom acabamento de pele
- ▶ Boa conservação

Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 01-3218 x ALMERA
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: alta / 8
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 365

Teor de matéria seca: 19,9%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5



agricopotatoes.pt/levante

Markies.



Variedade tardia de elevado rendimento, adequada para batatas fritas em palitos, rodela, fast-food (QSR - restaurantes de serviço rápido) e consumo em fresco.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Múltiplas resistências a vírus
- ▶ Boa conservação

Características principais

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamento: FIANNA x AGRIA
Maturação: tardia / 4
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5

Peso debaixo de água: 427
Teor de matéria seca: 22,8%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Qualidade para fritura em rodela: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 6,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7



agricopotatoes.pt/markies

Manitou.



Variedade tardia, de atrativa pele vermelha e elevado rendimento.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa tolerância à secura
- ▶ Múltipla resistência aos nemátodes dos quisto da batateira

Características principais

Obtentor: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Cruzamento: LAURA x MARANCA
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 351

Teor de matéria seca: 19,4%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inferior à média / 5,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/manitou

Melrose.



Variedade multiusos, semitardia, com um sabor intenso.

- ▶ Polpa bastante farinhenta após cozedura
- ▶ Polpa amarela
- ▶ Pele vermelha clara

Características principais

Obtentor: C.R.A.
Cruzamento: BP 15.7.70 x AM 15.1.68
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: superior à média / 6,5
Tuberização: alta / 8
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 406
Teor de matéria seca: 22%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 7



agricopotatoes.pt/melrose

Meryem.



Tradicional

Variedade tardia, de elevado rendimento com uma bonita pele vermelha.

- ▶ Boa tolerância à secura
- ▶ Boa tuberização
- ▶ Boa resistência a vírus



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LUSA x AR 01-0420
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: superior à média / 6,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: curta / 4

Peso debaixo de água: 349
Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/meryem

Milva.



Retalho Fresco

Variedade semitardia com uma boa resistência à sarna comum e rendimento muito elevado.

- ▶ Polpa bastante farinhenta após cozedura
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Tuberização elevada



Características principais

Obtentor: Saatzucht Berding
Cruzamento: NENA x DUNJA
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: alta / 8

Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 380
Teor de matéria seca: 20,7%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6



agricopotatoes.pt/milva

Napoleon.

Reliable potato for top-quality potato chips!

O poder da inovação

Variedade tardia para fritura em rodela (chips), com boa uniformidade de calibre e elevado teor de matéria seca.



Indústria
Rodelas Flocos

- ▶ Boa qualidade de fritura em rodela (chips)
- ▶ Adequada para a indústria de flocos
- ▶ Boa resistência a vírus

Todas as informações e dados técnicos da variedade spotlight podem ser encontrados na **página 20** ou digitalizar o código QR.



agricopotatoes.pt/napoleon

Palace.



Variedade tardia de elevado rendimento, para a indústria de batatas fritas em palitos e adequada para cultivo em diferentes tipos de solo.

- » Elevado teor de matéria seca
- » Tubérculos grandes
- » Bonito acabamento de pele

Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 01-3350 x ADD 93-20902
Maturação: tardia / 4,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6

Dormência: média a curta / 5
Peso abaixo de água: 430
Teor de matéria seca: 23,2%
Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5



agricopotatoes.pt/palace

Picasso.



Variedade tardia de pele amarela, com olhos vermelhos proeminentes, boa resistência à sarna comum e aptidão para longos períodos de armazenamento.

- » Elevado rendimento
- » Boa tolerância à secura
- » Boa tolerância a manchas negras e danos mecânicos.

Características principais

Obtentor: Duoplant V.O.F.
Cruzamento: CARA x AUSONIA
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: longa / 8
Peso abaixo de água: 381

Teor de matéria seca: 20,8%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: inadequada / 5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7
Verruga negra F1: resistente / 10




agricopotatoes.pt/picasso

Paradiso.

A batata completa: forte, fabulosa e com rendimentos impressionantes!

O poder da inovação

Variedade semitardia, para o mercado tradicional, de tubérculos grandes e excelente rendimento.



- » Elevado rendimento
- » Excelente aspeto
- » Folhas firmes



Todas as informações e dados técnicos da variedade spotlight podem ser encontrados na **página 22** ou digitalizar o código QR.



agricopotatoes.pt/paradiso

Premiere.



Variedade muito precoce para a indústria de batatas fritas em palitos, com um bom rendimento precoce.

- » Expedição diretamente do campo
- » Elevado teor de matéria seca
- » Boa distribuição da matéria seca



Características principais

Obtentor: Precardi
Cruzamento: CIVA x PROVITA
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5
Peso abaixo de água: 416

Teor de matéria seca: 22,4%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/premiere

Riviera.



Variedade muito precoce de pele atrativa, excelente tolerância ao calor, boa resistência a vírus e bom rendimento.

- » Tubérculos grandes
- » Excelente aspeto
- » Boa resistência a vírus



Características principais

Obtentor: Mts. Boerhave
Cruzamento: MINERVA x ALCMARIA
Maturação: muito precoce / 8
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: excelente / 8
Tuberização: baixa a média / 5

Dormência: média / 6
Peso abaixo de água: 318
Teor de matéria seca: 17,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/riviera

Ranomi.



Variedade precoce com resistência relativamente boa à sarna comum e bom rendimento.

- » Bonito acabamento de pele
- » Tubérculos grandes
- » Polpa bastante firme após cozedura



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6

Peso abaixo de água: 322
Teor de matéria seca: 17,9%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/ranomi

Rudolph.



Variedade semitardia, de pele vermelha muito atrativa, boa tolerância ao calor e rendimento muito elevado.

- » Polpa branca
- » Tubérculos grandes
- » Boa conservação



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: CHIEFTAIN x STIRLING
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: branca / 4
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: média a longa / 7
Peso abaixo de água: 376

Teor de matéria seca: 20,5%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente / 10
Verruga negra F6: moderadamente suscetível / 8



agricopotatoes.pt/rudolph

Sevilla.



Variedade tardia com bom peso dentro de água, muito saborosa e resistente ao míldio da folha.

- ▶ Resistente ao míldio
- ▶ Baixa necessidade em azoto
- ▶ Boa tolerância à secura



Características principais

Obtentor: N. Vos
Cruzamento: AGRIA x DOB 1997-507-015
Maturação: tardia / 4,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: longa / 8

Peso debaixo de água: 385
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9



agricopotatoes.pt/sevilla

Sinora.



Variedade semiprecoce, de elevado rendimento, fácil de cultivar, para cultura precoce de batata para fritura em palitos (french fries) ou rodelas (chips).

- ▶ Expedir diretamente do campo
- ▶ Elevado teor de matéria seca
- ▶ Boa resistência a vírus



Características principais

Obtentor: J. Schilt
Cruzamento: AGRIA x AM 70-2166
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 416
Teor de matéria seca: 22,6%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodelas: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9



agricopotatoes.pt/sinora

Sidney (AR 12-1680).



Variedade semitardia, polpa branca, para a indústria de batatas fritas aos palitos.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa resistência a vírus
- ▶ Boa dormência



Características principais

Obtentor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LADY ANNA x AR 05-3392
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: branca / 4,5
Acabamento de pele: bastante fraca / 5
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 396
Teor de matéria seca: 21,5%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B

Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: moderadamente suscetível / 6



agricopotatoes.pt/sidney

Sivas (KO 13-2242).



Variedade semitardia de grandes tubérculos ovais, boa dormência e boa tolerância ao azulamento.

- ▶ Alto rendimento
- ▶ Boa resistência aos vírus e sarna
- ▶ Bonito acabamento de pele



Características principais

Obtentor: Konst Research B.V.
Cruzamento: KO 06-1457 x SAVANNA
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: baixa a média / 5,5
Dormência: média a longa / 7,5
Peso debaixo de água: 350

Teor de matéria seca: 19,2%
Grupo culinário: firme / A
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10




agricopotatoes.pt/sivas

Spectra.



Variedade semiprecoce de elevado rendimento, com tubérculos muito regulares em forma, de pele macia muito atrativa.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Boa tuberização
- ▶ Tubérculos de calibre uniforme



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: ARIELLE x SOFIA
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: muito boa / 7,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média a curta / 5

Peso debaixo de água: 324
Teor de matéria seca: 17,9%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/spectra

Thalia.



Variedade semitardia, de boa dormência, polpa amarela e resistente aos nematodes globodera pallida.

- ▶ Atrativa polpa amarela clara
- ▶ Polpa firme após cozedura
- ▶ Bom teor de matéria seca



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: BELANA x AR 01-3576
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: superior á média / 6,5
Tuberização: média alta / 7
Dormência: longa / 8
Peso debaixo de água: 385

Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: firme / A
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo / 8
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: resistente em campo / 7



agricopotatoes.pt/thalia

Spunta.



Variedade de ciclo médio com uma boa tolerância ao calor e elevado rendimento.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Tubérculos de calibre uniforme
- ▶ Elevado teor de matéria seca



Características principais


Obtentor: J. Oldenburger
Cruzamento: BEA x USDA 96-56
Maturação: semitardia / 6
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 387
Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: média / 6
Míldio da folha: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/spunta

Twinner.



Variedade precoce, resistente ao míldio da folha e do tubérculo, para cultivo convencional e biológico.

- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Polpa bastante firme após cozedura



Características principais


Obtentor: G.W. te Winkel
Cruzamento: MA 98-0032 x AR 00-87-22
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: baixa a média / 5
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 359

Teor de matéria seca: 19,7%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: resistente / 10



agricopotatoes.pt/twinner

Twister.



Variedade semiprecoce, resistente ao míldio da folha e do tubérculo, bom rendimento, para produção convencional e biológica.

- ▶ Excelente aspeto
- ▶ Boa conservação
- ▶ Polpa bastante firme após cozedura



Características principales

Obtento: G.W. te Winkel
Cruzamento: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6,5
Dormência: média a longa / 7
Peso debaixo de água: 345

Teor de matéria seca: 19%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9
Verruga negra F1: moderadamente suscetível / 8



agricopotatoes.pt/twister

Vogue.



Variedade semiprecoce, com tubérculos de calibre grande e uniforme.

- ▶ Polpa bastante firme após cozedura
- ▶ Tubérculos grandes
- ▶ Tuberização precoce



Características principales

Obtenzor: Konst Research B.V.
Cruzamento: MARABEL x AMOROSA
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: baixa a média / 5,5
Dormência: média a curta / 5

Peso abaixo de água: 311
Teor de matéria seca: 17,3%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente / 9
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: ligeiramente suscetível / 9



agricopotatoes.pt/vogue

Notes.

Um vislumbre do futuro do cultivo da batata

Estamos entusiasmados por partilhar um vislumbre das nossas novas e promissoras variedades de batata. Atualmente, estão na fase final de testes, por isso ainda não estão disponíveis para venda. Aqui pode ver uma antevisão exclusiva do «futuro próximo» do cultivo da batata. » »

AR 14-0334.



Tradicional

Variedade precoce, tradicional e de varejo, com boa aparência da pele e bom tamanho.

- ▶ Boa produtividade
- ▶ Boa aparência da pele
- ▶ Bom tamanho



Características principais

Obtento: Agrico Research B.V.
Cruzamento: OS 07-0020 x SAVIOLA
Maturação: precoce / 7,5
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média / 6

Dormência: média a curta / 5,5
Peso abaixo de água: 332
Teor de matéria seca: 18,3%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

AR 14-3488.

Indústria
Palitos

Variedade de safra principal, altamente produtiva, para a indústria de batatas fritas, adequada para cultivo em diferentes tipos de solo.

- ▶ Alta produtividade
- ▶ Alto teor de matéria seca
- ▶ Resistência múltipla à verruga da batata



Características principais

Obtento: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x AR 07-4113
Maturação: semitardia / 5,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6
Peso abaixo de água: 427
Teor de matéria seca: 23%

Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: moderadamente suscetível* / 6*
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente* / 10*
Verruga negra F6: resistente* / 10*
Verruga negra F18: moderadamente suscetível* / 7*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

AR 14-2127.

Indústria
Palitos

Variedade de processamento, semi-precoce, com bom tamanho e teor de matéria seca.

- ▶ Boa produtividade e tamanho
- ▶ Muito boa qualidade para fritura
- ▶ Bom teor de matéria seca



Características principais

Obtento: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 07-2176 x AR 08-3491
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: média / 6
Dormência: média a curta / 5,5
Peso abaixo de água: 438
Teor de matéria seca: 23,6%

Grupo culinário: farinhenta / C
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*
Nemátode dourado Ro 2/3: resistente em campo* / 8*
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6
Nemátode, Globodera pallida Pa 2: resistente em campo* / 7*
Nemátode, Globodera pallida Pa 3: moderadamente suscetível* / 6*
Verruga negra F1: moderadamente suscetível* / 7*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

AR 14-3578.

Indústria
Rodelas

Variedade de safra principal para batatas chips, com boa uniformidade de forma e tamanho dos tubérculos e bom teor de matéria seca.

- ▶ Forma e tamanho regulares
- ▶ Boa qualidade para batatas fritas, mesmo após armazenamento prolongado
- ▶ Poucos defeitos nos tubérculos



Características principais

Obtento: Agrico Research B.V.
Cruzamento: LEANDRA x VR 808
Maturação: tardia / 5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior á média / 5,5
Tuberização: média / 6
Dormência: média / 6,5

Peso abaixo de água: 465
Teor de matéria seca: 24,9%
Grupo culinário: farinhenta / BC
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Qualidade para fritura em rodela: boa / 7
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*

Itens com asterisco (*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.

AR 16-1404.



Variedade de processamento, semi-precoce, com bom tamanho e formato regular dos tubérculos.

- ▶ Boa tolerância à requeima na folhagem
- ▶ Resistente ao vírus Y
- ▶ Boa contagem de tubérculos



Características principais

Obtenteor: Agrico Research B.V.
Cruzamento: AR 10-4512 x JOLENE
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela / 7
Acabamento de pele: média / 6
Tuberização: - / -
Dormência: média a curta / 5,5
Peso debaixo de água: 389

Teor de matéria seca: 21,10%
Grupo culinário: moderadamente firme / AB
Qualidade para fritura em palitos: muito boa / 7,5
Qualidade para fritura em rodela: - / -
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*
Míldio da folha: ligeiramente suscetível / 8
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

SW 14-6968.



Variedade de alta produtividade precoce, com qualidade para batatas fritas caseiras e boa tolerância à sarna.

- ▶ Produtividade precoce e boa
- ▶ Boa aparência da pele
- ▶ Boa resistência a vírus



Características principais

Obtenteor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: LAUDINE x AR 05-1847
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: média alta / 7
Dormência: média / 6
Peso debaixo de água: 386

Teor de matéria seca: 21%
Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: excelente / 8
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo* / 8*
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

CR 13-3717.



Variedade precoce de safra principal, com tubérculos grandes, adequada para o mercado de processamento.

- ▶ Variedade de nova geração
- ▶ Alta produtividade
- ▶ Boa tolerância à sarna



Características principais


Obtenteor: Mts. Crijns-Hop
Cruzamento: AR 07-3626 x AR 05-3409
Maturação: semiprecoce / 6,5
Cor da polpa: amarela clara / 6
Acabamento de pele: inferior à média / 5,5
Tuberização: - / -
Dormência: média / 6,5
Peso debaixo de água: 378
Teor de matéria seca: 20,40%

Grupo culinário: moderadamente farinhenta / B
Qualidade para fritura em palitos: superior à média / 6,5
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*
Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5
Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 8,5

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

➕ As variedades marcadas com este símbolo são variedades de Nova Geração com genes de resistência empilhados.

SW 14-7008.



Variedade de salada, semi-precoce, com tubérculos ovais e longos, tipo de cozimento A e forte resistência ao PVY.

- ▶ Boa aparência da pele
- ▶ Tipo de cozimento A
- ▶ Boa resistência ao PVY



Características principais

Obtenteor: Lantmännen Seed B.V.
Cruzamento: LORELEY x SW 06-0296
Maturação: semiprecoce / 7
Cor da polpa: amarela clara / 6,5
Acabamento de pele: boa / 7
Tuberização: alta / 8
Dormência: média / 6

Peso debaixo de água: 358
Teor de matéria seca: 19,60%
Grupo culinário: firme / A
Nemátode dourado Ro 1/4: resistente* / 9*
Míldio do tubérculo: suscetível / 5,5
Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

SW 14-8034.



Retalho
Salada

Variedade especial de varejo, precoce, altamente produtiva, com tubérculos regulares e boa aparência da pele.

- ▶ Variedade precoce e tubérculos regulares
- ▶ Boa resistência a vírus e sarna
- ▶ Boa aparência da pele



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamento: CHATEAU x FINESSA

Maturação: muito precoce / 8

Cor da polpa: amarela clara / 6

Acabamento de pele: muito boa / 7,5

Tuberização: média alta / 7

Dormência: média / 6

Peso abaixo de água: 360

Teor de matéria seca: 19,7%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 6,5

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

TW 17-1410.



Biológico



Retalho
Fresco



Variedade de safra principal precoce, com pele vermelha, resistente à requeima tardia na folhagem e nos tubérculos, adequada para produção convencional e orgânica.

- ▶ Alta produtividade
- ▶ Boa resistência a vírus
- ▶ Cor de pele bonita



Características principais

Obtentor: G.W. te Winkel

Cruzamento: ALOUETTE x AR 09-4077

Maturação: semitardia / 5,5

Cor da polpa: amarela clara / 6,5

Acabamento de pele: boa / 7

Tuberização: - / -

Dormência: média a curta / 5

Peso abaixo de água: 366

Teor de matéria seca: 20%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Nemátode dourado Ro 1/4: resistente em campo* / 8*

Míldio da folha: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

+ As variedades marcadas com este símbolo são variedades de Nova Geração com genes de resistência empilhados.

SW 15-6459.



Indústria
4ª Gama

Variedade de varejo, semi-precoce, com tubérculos ovais e boa aparência da pele.

- ▶ Boa aparência da pele
- ▶ Boa produtividade
- ▶ Textura de cozimento firme



Características principais

Obtentor: Lantmännen Seed B.V.

Cruzamento: REGINA x SA06-0104

Maturação: semiprecoce / 6,5

Cor da polpa: amarela / 7

Acabamento de pele: bastante fraca / 5

Tuberização: - / -

Dormência: média a curta / 5,5

Peso abaixo de água: 397

Teor de matéria seca: 21,50%

Grupo culinário: moderadamente firme / AB

Nemátode dourado Ro 1/4: moderadamente suscetível* / 6*

Míldio do tubérculo: ligeiramente suscetível / 7,5

Verruga negra F1: resistente* / 10*

Itens com asterisco () são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.*

Partilhando a genética e a experiência em todo o mundo

A Agrico não se limita a exportar batatas de semente dos Países Baixos; a nossa genética e a nossa experiência também são partilhadas em todo o mundo. Com as nossas variedades com licença exclusivas*, apoiamos os clientes no desenvolvimento dos seus mercados oferecendo batatas com elevado valor acrescentado, começando pela cultura de tecidos *in vitro*. É com orgulho que apresentamos as nossas melhores variedades com licença. ▶▶

* Nos Países Baixos, estas variedades não são cultivadas como batatas de semente.

Agostino.



Allstar.



Almera.



Anouk.



Ardeche.



Arrow.



Bellanita.



Chateau.



Corsica.



Excellency.



Fyone.



Gourmandine.



Janick (PL 13-0304).



Nofy.



Prince.



Rousseau.



Volare.



Nome	Página	Cultivo	Segmento de mercado			Rótulos		Características								Resistências							
								Maturação	Cor da pele		Cor da polpa	Forma dos tubérculos	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo	
Adato	26		✓	Fresco				6	A		5,5	OL	20,4	BC		6,5	9	-	-	-	5	7,5	
Agata	26		✓	Fresco				8	A		6	O	17,6	AB			9	-	-	-	5	6	
Agria	27	✓	✓	Fresco	Palitos Rodelas 4ª Gama		✓	5	A		7	OL	21,8	BC	7	8	9	-	2	2	5,5	7	
Alouette	27	✓	✓	Fresco	4ª Gama	✓		6	R		7,5	OL	21,1	AB		6,5	9	8	-	-	9	9	
AR 14-0334	56		✓					7,5	A		6,5	OL	18,3	AB			1*	-	-	-	3,5	6	
AR 14-2127	56				Palitos			7	A		6	O	23,6	C		8	9*	-	4*	5*	4,5	-	
AR 14-3488	57				Palitos			5,5	A		6	OL	23	C		7	6*	-	-	-	4	5,5	
AR 14-3578	57				Rodelas			5	A		6	OR	24,9	BC	7		9*	-	-	-	4,5	5	
AR 16-1404	58		✓		Palitos	✓		6,5	A		7	O	21,2	AB		7,5	9*	-	-	-	8	-	
Arizona	28		✓					7	A		6	O	17	AB			9	-	-	-	4	5	
Armedi	28				Palitos			5,5	A		6	OL	21,8	C		8	9	7	9	8	4	7,5	
Arsenal	29				Rodelas Flocos			5,5	A		6	RO	24	BC	7		9	8	9	8	4,5	5,5	
Artemis	29		✓	Fresco				7	A		6	OL	20,4	B		6	9	-	-	-	5	8	
Babylon	30		✓	Fresco	Palitos Rodelas 4ª Gama			5	A		7	OL	21,7	BC	7	8	8	-	-	-	5,5	6,5	
Beyonce	30	✓			Rodelas Flocos	✓		6	A		6,5	OR	23,9	BC	8		4	-	-	-	8,5	7,5	
Carolus	31	✓	✓	Fresco		✓		6	A/R		7	O	21,6	BC		7	-	-	-	-	9	9	
Cerisa	31			Salada				7,5	R		7	L	21,3	A			-	-	-	-	4	7	
Chester (AR 13-2694)	12, 32				Rodelas Flocos			6	A		6,5	OR	24	C	7		4*	2*	8*	7*	5	5	
Constance	32		✓	Fresco				7	A		6,5	OR	19,7	AB			-	-	-	-	5	4,5	
Corazon	33		✓	Fresco				7	R		6	OL	17,8	AB			9	9	-	-	4,5	6,5	
CR 13-3717	58	✓			Palitos	✓+		6,5	A		6	LO	20,4	B		6,5	9*	-	-	-	8,5	8,5	
Diamant	33		✓					6	A		6	O	23	B		7	9	-	-	-	6	7	



Nome	Página	Cultivo	Segmento de mercado			Rótulos	Características										Resistências						
								Maturação	Cor da pele		Cor da polpa	Forma dos tubérculos	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo	
Ditta	34	✓			Fresco, Salada				6	A		6,5	LO	20,2	A		9	-	-	-	5,5	7	
Erika	34				Fresco, Salada				7,5	A		6	LO	18,6	A		9	-	-	-	3,5	4	
Esmee	35		✓		Fresco				6,5	R		7	OL	18	AB		-	-	-	-	4,5	7	
Evolution	35		✓						6,5	R		6	OL	18,9	B		9	6	7	5	4	6	
Fajah	36		✓						5,5	A		6	LO	19,4	BC		7	9	-	3	2	4	5,5
Fontane	36					Palitos Rodelas Flocos		✓	5,5	A		6,5	O	23,2	BC	6	7,5	9	-	-	-	5	6,5
Jacky	37	✓			Babies	4ª Gama	✓		6,5	A		6,5	RO	20,1	B		9	-	-	-	9	9	
Jolene	37		✓		Fresco				6	A		6	OL	21,1	B		7	-	-	-	-	4	5
Kuroda	38		✓						6	R		6	O	23	BC		5,5	9	-	-	-	5	5
Leonore (AR 13-1059)	38					Palitos			7,5	A		7	LO	21,5	BC		7	9*	-	-	-	3,5	5
Levante	40	✓	✓		Fresco		✓		5,5	A		6	LO	19,9	B		5,5	9	-	-	-	8,5	7,5
Lugano	18, 39		✓			Palitos			5,5	A		6,5	OL	21,4	B		7	9	9	9	9	5	5,5
Manitou	40		✓		Fresco				5	R		6	LO	19,4	B		5,5	9	9	-	-	5	6
Markies	41		✓			Palitos Rodelas		✓	4	A		6,5	OL	22,8	BC	7	8	9	-	-	-	6,5	7
Melrose	41				Fresco, Especiali- dades	4ª Gama			6	R		7	O	22	B		6,5	-	-	-	-	4	-
Meryem	42		✓						5	R		6,5	LO	19,2	B			-	-	-	-	4,5	6
Milva	42				Fresco				5	A		7	O	20,7	B			9	-	-	-	4,5	6
Napoleon	20, 43					Rodelas Flocos			5	A		6,5	RO	24,1	BC	8		9	-	4	2	6	6,5
Palace	44		✓		Fresco	Palitos Flocos			4,5	A		6	O	23,2	C		8	-	-	2	2	5	6,5
Paradiso	22, 45		✓						5,5	A		6	OL	18,2	B			9	-	-	-	5,5	6,5
Picasso	44		✓						5	A/R		6	O	20,8	B		5	9	-	-	-	5	7



Nome	Página	Cultivo	Segmento de mercado		Rótulos		Características										Resistências							
								Maturação	Cor da pele		Cor da polpa	Forma dos tubérculos	Teor de matéria seca	Grupo culinário	Qualidade para fritura em rodelas	Qualidade para fritura em palitos	Ro 1,4	Ro 2,3	Pa 2	Pa 3	Míldio da folha	Míldio do tubérculo		
Premiere	46				Palitos			8	A		6	OR	22,4	BC		6,5	9	-	-	-	4	6		
Ranomi	46		✓	Fresco				7,5	A		6,5	OL	17,9	AB			9	-	-	-	4	6		
Riviera	47		✓					8	A		6	OR	17,7	AB			9	-	-	-	3	5		
Rudolph	47		✓					5,5	R		4	OR	20,5	AB		6,5	-	-	-	-	5,5	5,5		
Sevilla	48	✓			Palitos Rodelas			4,5	A		7	O	21	C		7,5	-	-	-	-	9	-		
Sidney (AR 12-1680)	48				Palitos			6	A		4,5	LO	21,5	B		6,5	9	4	8	6	4	8		
Sinora	49				Palitos Rodelas		✓	7	A		6,5	OR	22,6	B	7	7,5	9	-	4	2	4,5	5		
Sivas (KO 13-2242)	14, 49		✓					5,5	A		6	O	19,2	A		6	9*	-	-	-	5,5	6		
Spectra	50		✓	Fresco				7	A		6	OR	17,9	AB			9	-	-	-	4,5	6		
Spunta	50		✓					6	A		6	L	21	BC		6	-	-	2	2	5,5	5		
SW 14-6968	59			Fresco				7	A		6,5	O	21	B			8*	-	-	-	4	5,5		
SW 14-7008	59			Salada				7	A		6,5	OL	19,6	A			9*	-	6*	3*	3,5	5,5		
SW 14-8034	60			Salada				8	A		6	OL	19,7	AB			1*	-	-	-	3,5	6,5		
SW 15-6459	60				4ª Gama			6,5	A		7	RO	21,5	AB			6*	5*	-	-	3	7,5		
Thalia	51			Fresco				5,5	A		7	O	21	A			3	2	8	7	5	7,5		
TW 17-1410	61	✓		Fresco		✓+		5,5	R		6,5	OR	20	AB			8*	-	-	-	9	9		
Twinner	51	✓	✓	Fresco		✓		7,5	A		7	O	19,7	AB			9	-	-	-	8	9		
Twister	52	✓	✓	Fresco		✓		7	A		6,5	RO	19	AB			9	-	-	-	9	9		
Vogue	52		✓					6,5	A		7	OL	17,3	AB			9	-	-	-	4	6		

* Itens assinalados com asterisco (*) baseiam-se na nossa própria investigação e não foram ainda oficialmente publicados. ■

Segmento de mercado

 Tradicional	
 Retalho	• Fresco, Babies, Salada, Especialidades
 Indústria	• Palitos, Rodelas, Flocos, Fécula, 4ª Gama

Método de cultivo

 Biológico (Adequada para cultura em modo de produção biológico)	
---	--

Variedades para Next Generation

	As variedades marcadas com o símbolo Next Generation têm uma resistência natural à requeima.
	As variedades marcadas com este símbolo são variedades Next Generation com genes de resistência empilhados.

Agrico Originals

	As variedades, marcadas com o símbolo Agrico Originals, têm desempenhado um papel fundamental no cultivo global da batata e realmente fizeram a diferença.
---	--

Características da planta e dos tubérculos
Plant and tuber characteristics

Maturação	4 tardia; 4,5 tardia; 5 tardia; 5,5 semitardia; 6 semitardia; 6,5 semiprecoce; 7 semiprecoce; 7,5 precoce; 8 muito precoce; 8,5 muito precoce; 9 muito precoce
-----------	--

Brolho de cor clara	Violeta Vermelha Vermelha Violeta Azul Violeta Voleta Verde Verde Violeta Vermelha Verde Vermelha Verde Violeta Azul Vermelha
Cor da flor	B branca RC roxa clara R roxa AC azul clara A azul V violeta RE roxa escura RA roxa azulada
Número de bagas	4 muito elevado; 4,5 elevado; 5 superior à média; 5,5 superior à média; 6 médio; 6,5 inferior à média; 7 inferior à média; 7,5 baixo; 8 nenhuma
Folhagem - desenvolvimento inicial	4 lento; 4,5 lento; 5 bastante lento; 5,5 bastante lento; 6 médio; 6,5 médio; 7 bastante rápido; 7,5 bastante rápido; 8 rápido
Folhagem - desenvolvimento final	4 fraco; 4,5 fraco; 5 fraco; 5,5 fraco; 6 fraco; 6,5 moderado; 7 médio; 7,5 bastante bom; 8 bom
Firmeza da folhagem	4 frágil; 4,5 frágil; 5 bastante frágil; 5,5 bastante frágil; 6 média; 6,5 média; 7 bastante firme; 7,5 bastante firme; 8 firme
Cor da pele	amarela vermelha amarela com olhos vermelhos castanha-avermelhada roxa
Cor da polpa	4 branca; 4,5 branca; 5 cremosa; 5,5 cremosa; 6 amarela clara; 6,5 amarela clara; 7 amarela; 7,5 amarela; 8 amarela escura; 8,5 laranja

Acabamento de pele	3 rugosa; 3,5 rugosa; 4 muito fraca; 4,5 fraca; 5 bastante fraca; 5,5 inferior á média; 6 média; 6,5 superior á média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente
Forma dos tubérculos	R redonda RO redonda oval OR oval redonda O oval OL oval alongada LO longa oval L longa
Regularidade da forma	4 irregular; 4,5 irregular; 5 bastante irregular; 5,5 bastante irregular; 6 bastante irregular; 6,5 bastante irregular; 7 regular; 7,5 regular; 8 regular
Tuberização	4 baixa; 4,5 baixa; 5 baixa a média; 5,5 baixa a média; 6 média; 6,5 média; 7 média alta; 7,5 média alta; 8 alta; 8,5 alta; 9 alta
Regularidade do calibre	4 baixa; 4,5 baixa; 5 baixa a média; 5,5 baixa a média; 6 média; 6,5 média; 7 média alta; 7,5 média alta; 8 alta 8,5 alta; 9 alta
Calibre dos tubérculos	4 pequeno; 4,5 pequeno; 5 pequeno a médio; 5,5 pequeno a médio; 6 médio; 6,5 médio; 7 médio a grande; 7,5 médio a grande; 8 grande
Dormência	4 Curta; 4,5 Curta; 5 Média a curta; 5,5 Média a curta; 6 Média; 6,5 Média; 7 Média a longa; 7,5 Média a longa; 8 Longa

Sensibilidade e qualidade

Segundos crescimentos;	4 muito sensível; 4,5 muito sensível;
Manchas negras;	5 Sensível; 5,5 Sensível; 6 moderadamente sensível;
Rachamentos;	6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível;
Danos mecânicos	7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível

Metribuzina (antes e depois emergência)	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 Sensível; 5,5 Sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível
Etileno	4 - 5% menos tubérculos 4,5 - 5% menos tubérculos 5 - 5% menos a 5% mais tubérculos 5,5 - 5% menos a 5% mais tubérculos 6 - 5% a 15% mais tubérculos 6,5 - 5% a 15% mais tubérculos 7 - 15% a 25% mais tubérculos 7,5 - 15% a 25% mais tubérculos 8 - 25% mais tubérculos
Peso debaixo de água	300g menos, 500g mais
Teor de matéria seca	17% menos, 26,5% mais
Grupo culinário	A firme AB moderadamente firme B moderadamente farinhenta BC farinhenta C farinhenta CD farinhenta
Descoloração após cozedura	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 sensível; 5,5 sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível
descoloração em cru	4 muito sensível; 4,5 muito sensível; 5 sensível; 5,5 sensível; 6 moderadamente sensível; 6,5 moderadamente sensível; 7 ligeiramente sensível; 7,5 ligeiramente sensível; 8 ligeiramente sensível a não sensível



qualidade para fritura em palitos	4 inadequada; 4,5 inadequada; 5 inadequada; 5,5 inferior à média; 6 média; 6,5 superior à média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente;	Míldio da folha; Míldio do tubérculo; Sarna comum; Sarna pulverulenta; Fusarium; Antracnose; TRV; Vírus do enrolamento; Vírus Yn; Vírus - Yntn (tubérculo)	2 muito suscetível; 2,5 muito suscetível; 3 muito suscetível; 3,5 muito suscetível; 4 muito suscetível; 4,5 muito suscetível; 5 suscetível; 5,5 suscetível; 6 ligeiramente suscetível; 6,5 ligeiramente suscetível; 7 ligeiramente suscetível; 7,5 ligeiramente suscetível; 8 ligeiramente suscetível a não suscetível; 8,5 ligeiramente suscetível a não suscetível; 9 ligeiramente suscetível a não suscetível
Distribuição da matéria seca	5 bastante baixa; 5,5 bastante baixa; 6 média; 6,5 média; 7 boa; 7,5 boa; 8 excelente; 8,5 excelente; 9 excelente; 9,5 excelente;		
Qualidade para fritura em rodelas	4 inadequada; 4,5 inadequada; 5 inadequada; 5,5 inferior à média; 6 média; 6,5 superior à média; 7 boa; 7,5 muito boa; 8 excelente;	Verruga negra F1, F6, F 18	1 muito suscetível; 2 muito suscetível; 3 muito suscetível; 4 muito suscetível; 5 bastante suscetível; 6 bastante suscetível; 7 moderadamente suscetível; 8 moderadamente suscetível; 9 ligeiramente suscetível; 10 resistente
Nível TGA	Indica o nível de TGA (glicocalcóides medidos em mg por 100g).		

Sensibilidade e qualidade

Sensibilidade e qualidade

	Sensibilidade relativa (%)	
Nemátodes	9	< 1
do quisto da	8	1,1-3
batateira;	7	3,1-5
Nemátode	6	5,1-10
dourado: Ro 1, 2,	5	10,1-15
3 e 4; Nemátode,	4	15,1-25
Globodera pallida:	3	25,1-50
Pa 2 e 3	2	50,1-100
	1	> 100

1 suscetível; 2 suscetível; 3 suscetível; 4 suscetível; 5 moderadamente suscetível; 6 moderadamente suscetível; 7 resistente em campo; 8 resistente em campo; 9 resistente

Notas.

English	Nederlands	Deutsch	Français	Español	Português
Baby potatoes	Krielaardappelen	Drillinge	Grenailles	Patatas baby	Babies
Black spot (internal bruising)	Stootblauw	Schwarzfleckigkeit	Noircissement de la chair	Antracnosis	Manchas negras
Breeder	Kweker	Züchter	Obtenteur	Obtentor	Obtentor
Common scab	Schurft	Schorf	Gale commune	Sarna común	Sarna comum
Convenience	Koelvers	Fertigprodukten	4ème gamme	Precocinadas	4ª Gama
Cooking type	Kooktype	Kochtyp	Type de cuisson	Tipo de cocción	Grupo culinário
Crisps	Chips	Chips	Chips	Patatas fritas de bolsa (chips)	Rodelas
Crisping quality	Geschikt voor chips	Geeignet für Chips	Utilisation possible en Chips	Calidad para chips	Qualidade para fritura em rodelas
Crossing	Kruising	Kreuzung	Croisement	Cruzamiento	Cruzamento
Discolouration after cooking	Grauwverkleuring (na koken)	Grauverfärbung (nach dem Kochen)	Noircissement après cuisson	Coloración gris (después de la cocción)	Descoloração após cozedura
Dormancy	Kiemrust	Keimruhe	Dormance	Dormancia	Dormência
Dry matter content	Drogestofgehalte	Trockensubstanzgehalt	Matière sèche	Contenido de materia seca	Teor de matéria seca
Dry matter distribution	Drogestofverdeling	Trockenmasseverteilung	Répartition de la matière sèche	Distribución de la materia seca	Distribuição da matéria seca
Flakes	Vlokken	Flocken	Flocon	Copos	Flocos
Flesh colour	Vleeskleur	Fleischfarbe	Couleur de la chair	Color de la carne	Cor da polpa
Flower colour	Bloemkleur	Blütenfarbe	Couleur de la fleur	Color de la flor	Cor da flor
Foliage - final development	Loof - ontwikkeling volledig	Laub - Entwicklung Ende	Feuillage - développement final	Follaje - desarrollo final	Folhagem - desenvolvimento final
Foliage - firmness	Loof - stevigheid plant	Laub - Festigkeit	Feuillage - tenue	Follaje - firmeza	Firmeza da folhagem
Foliage - initial development	Loof - ontwikkeling begin	Laub - Entwicklung Anfang	Feuillage - développement initial	Follaje - desarrollo inicial	Folhagem - desenvolvimento inicial
French fries	Frites	Pommes frites	Frites	Patatas fritas	Palitos
Fresh	Vers	Frisch	Frais	Frescas	Fresco
Fries quality	Geschikt voor friet	Geeignet für Pommes	Utilisation possible en Frites	Calidad para patatas fritas	Qualidade para fritura em palitos
Growth cracks	Groeischeuren	Wachstumsrisse	Crevasse	Grietas de crecimiento	Rachamentos
Harvest damage	Rooibeschadiging	Rodebeschädigung	Dégâts d'arrachage mécanique	Daños de recolección	Danos mecânicos
Late blight - foliage	Phytophthora - loof	Krautfäule	Mildiou du feuillage	Mildiu de la hoja	Míldio da folha
Late blight - tuber	Phytophthora - knol	Braunfäule	Mildiou du tubercule	Mildiu del tubérculo	Míldio do tubérculo
Light sprout colour	Kiemkleur	Lichtkeim	Couleur du germe	Color claro del brote	Brolho de cor clara
Maturity	Rijptijd	Reifezeit	Maturité	Madurez	Maturação
Organic	Biologisch	Biologisch	Biologique	Ecológico	Biológico
Potato cyst nematodes	Aardappelmoehheid	Kartoffelzystennematoden	Nématodes	Nematodos del quiste de la patata	Nemátodos do quisto da batateira
Powdery scab	Poederschurft	Pulverschorf	Gale poudreuse	Sarna pulverulenta	Sarna pulverulenta
Processing	Verwerking	Verarbeitung	Industrie	Transformación	Indústria
Raw discolouration	Rauwverkleuring	Rohverfärbung	Grisaillement	Coloración en crudo	Descoloração em cru
Regularity of tuber shape	Regelmaat knolvorm	Regelmäßigkeit der Knollenform	Régularité de la forme	Regularidad de la forma de los tubérculos	Regularidade da forma
Regularity of tuber size	Regelmaat sortering	Größenregelmäßigkeit	Homogénéité de la taille	Regularidad del tamaño	Regularidade do calibre
Retail	Retail	Einzelhandel	Retail	Venta al por menor	Retalho
Salads	Salade	Salatsorten	Vapeur	Ensaladas	Salada
Secondary growth	Doorwas	Durchwuchs	Repousse	Crecimiento secundario	Segundos crescimentos
Skin colour	Schilkleur	Schalenfarbe	Couleur de la peau	Color de la piel	Cor da pele
Skin finish	Schilhoedanigheid	Schalenqualität	Qualité de la peau	Finura de la piel	Acabamento de pele
Specials	Speciaal	Spezielle	Spécialité	Especiales	Especialidades
Spraing	Kringerigheid	Stippigkeit	Ferrure	Manchas y/o círculos necróticos	TRV
Starch	Zetmeel	Stärke	Fécule	Fécula	Fécula
Traditional	Traditioneel	Traditionell	Traditionelle (consommation)	Tradicional	Tradicional
Tuberisation	Knolzetting	Knollenbildung	Tubérisation	Tuberización	Tuberização
Tuber shape	Knolvorm	Knollenform	Forme du tubercule	Forma de los tubérculos	Forma dos tubérculos
Tuber size	Grofheid knollen	Knollengröße	Grosseur des tubercules	Tamaño de los tubérculos	Calibre dos tubérculos
Underwater weight	Onderwatergewicht	Unterwassergewicht	Poids sous eau	Peso bajo agua	Peso debaixo de água
Wart disease	Wratziekte	Kartoffelkrebs	Gale verruqueuse	Sarna verrugosa	Verruga negra

Notas.



Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord

Duit 15, 8305 BB Emmeloord

The Netherlands

T +31 (0)527 639911 / E info@agrico.nl

I agricopotatoes.pt