

Adato.

MARKNADSSEGMENT




Traditional

Matpotatis
Färskpotatis

Mjölig sort med attraktivt skal
lämplig för både pack och skal.

- ▶ Bra skalkvalitet
- ▶ God tolerans mot torka
- ▶ Lämplig för kokning och hembakade produkter



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.

Korsning: NICOLA x RED BARON

Nummersort: SW 04-0087

Förädlarrätt: 31-12-2046

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medelsen / 6

Ljus groddens färg: röd-violett

Blomfärg: vit

Antal bär: över genomsnittlig / 6,5

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: tidig / 8

Blast - rensbarhet: genomsnittlig / 6

Blast - styrka: tålig / 8

Köttfärg: ljusgul / 5,5

Skalfärg: gul

Skalfinish: mycket bra / 7,5

Knölstorlek: ganska stora / 7,5

Knölform: oval lång

Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6,5

Knölsättning: ganska hög / 7

Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6,5

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: ganska kort / 5,5

Metribuzin: något känslig / 7,5

Bentazon: något till inte känslig / 8

Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6

Återväxt: ganska känslig / 6,5

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblått (inre blåmärken): ganska känslig / 6,5

Mekaniska skador: ganska känslig / 6

Undervattenvikt: 374

Torrsubstanshalt: 20,4%

Fördelning av torrsubstans: - / -

TGA-nivå: 4,56

Chips kvalitet: genomsnittligt / 6

Friterings kvalitet: över genomsnittet / 6,5

Koktyp: mjölig / BC

Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7

Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5

www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva + 20 %. Företrädesvis som delad gödsling, andra gödslingen strax efter knölbildningen.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 10 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Föredras att avgroddas en gång.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: mottaglig / 5

Brunröta: något mottaglig / 7,5

Vanlig skorv: något mottaglig / 6

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: något mottaglig / 6,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mottaglig / 5

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 6,5

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6

Potatiskräfta ras 1: något mottaglig / 9

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -