



Lugano.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης



Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/
τηγάρι

Κατάλληλη και για τη βιομηχανία,
υψηλή στερεά ουσία.

- ▶ Κιτρινόσαρκη, ιδανική για τηγάρι
- ▶ Μεγάλοι κόνδυλοι, ανθεκτική στους νηματώδεις
- ▶ Πολύ μακρύς χρόνος αποθήκευσης, καλές αποδόσεις



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: F.J. Vos

Διασταύρωση: AR 00-2211 x AR 99-0669

Σπορόφυτο: VO 07-0289

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2048

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοόψιμη / 5,5

Χρώμα φύτρου: κόκκινο

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: άνω του κανονικού / 7

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6,5

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβαλ μακρύ

Ομοιομορφία κονδύλων: αρκετά κανονικό / 6

Κονδυλοποίηση: αρκετά χαμηλή / 5

Κανονικότητα μεγέθους: κανονικό / 7

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: μακρύς / 8

Metribuzin (Sencor): ελάχιστο έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Bentazon: ελάχιστο έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Αιθυλένιο: 5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι / 6

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Βάρος εντός νερού: 394

Στερεά ουσία: 21,4%

Κατανομή στερεάς ουσίας: καλή / 7,5

Ποιότητα τσιπς: κάτω του κανονικού / 5,5

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): ελαφρά μαλακή / B

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6,5



agricopotatoes.gr/lugano

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +20%. Η εφαρμογή χλωριούχου καλίου δε συνιστάται, καθώς επηρεάζει τα στερεά των κονδύλων.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από δύο φορές, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 21-24 cm (60.000 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 29-32 cm (45.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 35-37 cm (37.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), δεν προκαλεί πρόβλημα στο φύλλωμα ή μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Συνιστάται προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητα

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: ανθεκτική / 9

Νηματώδης Pa2: ανθεκτική / 9

Νηματώδης Pa3: ανθεκτική / 9

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5

Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5,5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Καρκίνωση 1: ανθεκτική / 10

Καρκίνωση 6: ελάχιστα ευαίσθητη / 9

Καρκίνωση 18: - / -

* Οι ενδείξεις με αστερίσκο, βασίζονται σε ιδιωτικές προσωρινές διαπιστώσεις και δεν είναι επίσημα δημοσιευμένες.

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιερητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

