

Chateau.


MARKNADSSEGMENT



Matpotatis
Matpotatis

En tidig salladssort med bra knölsättning och ganska bra TS-halt.

- ▶ Utmärkt skalkvalitet
- ▶ Officiell registrering som "chair ferme"
- ▶ Hög knölsättning



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Agrico Research B.V.
Korsning: MA 98-0322 x AR 98-0341
Nummersort: AR 05-1443
Förädlarrätt: 31-12-2046

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: tidig / 7,5
Ljus groddens färg: blå-violett
Blomfärg: vit
Antal bär: under genomsnittlig / 5,5
Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5
Blast - slutlig utveckling: tidig / 8
Blast - rensbarhet: ganska lätt / 7
Blast - styrka: ganska tålig / 7

Köttfärg: ljusgul / 6,5
Skalfärg: gul
Skalfinish: bra / 7
Knölstorlek: ganska stora / 7
Knölform: lång oval
Knölens regelbundenhet: jämn / 7
Knölsättning: hög / 8
Regelbundenhet i storleken: jämn / 7

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: genomsnittligt / 6
Metribuzin: ganska känslig / 6
Bentazon: något känslig / 7,5
Etylen: 5 till 15 % fler knölar / 6

Återväxt: ganska känslig / 6,5
Växtsprickor: ganska känslig / 6,5
Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8
Mekaniska skador: känslig / 5

Undervattenvikt: 350
Torrsubstanshalt: 19,2%
Fördelning av torrsubstans: - / -
TGA-nivå: 4,2

Chips kvalitet: olämpligt / 4
Friterings kvalitet: olämpligt / 4
Koktyp: ganska fast / AB
Missfärgning efter råskalad: något känslig / 7,5
Grå missfärgning (efter kokning): något känslig / 7,5

www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva + 20 %.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar mer än en gång kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

30/40 mm: 23 cm (58.000 plantor/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst kan en standardanvändning av metribuzin (Sencor) ge en viss reaktion på blad och en viss minskning av skörden.

Svampbekämpningsmedel

Det är nödvändigt med ett strikt förebyggande sprutschema mot bladmögel.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato, say Agrico.

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: mycket mottaglig / 4

Brunröta: mottaglig / 5,5

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: något mottaglig / 7

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: mycket mottaglig / 4,5

Rost: mottaglig / 5

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: något mottaglig / 7

Virus - Yntn (knöl): något mottaglig / 6,5

Potatiskräfta ras 1: måttligt mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -