

Markies.

MARKTSEGMENT



Een laat, hoogopbrengend verwerkingsras, geschikt voor frites, fast-foodindustrie, chips en verse consumptie.

- » Grove knollen
- » Brede virusresistenties
- » Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: FIANNA x AGRIA
Zaailing: MA 85-0698
Kwekersrecht: 31-12-2029

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: laat / 4
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal lang
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6,5
Metribuzin: weinig gevoelig / 7
Bentazon: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: gevoelig / 5

Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 22,8%
Drogestofverdeling: goed / 7,5
TGA-gehalte: 3,4

Chipskwaliteit: goed / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Kooktype: kruimig / BC
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/markies

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3,5

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: vatbaar / 5

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - X: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5

Wratziekte F18 (T1): - / -