


# Gourmandine.

SEGMENTO DE MERCADO



Variedade semiprecoce para o segmento de saladas, de pele macia, atrativa e agradável sabor.

- ▶ Polpa firme após cozedura
- ▶ Boa apresentação
- ▶ Boa conservação



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

**Obtento:** Bretagne Plants  
**Cruzamento:** CHARLOTTE x ESTIMA  
**Clone:** 92 F 229-11  
**Direito do obtento:** 31-12-2032

### Características da planta e dos tubérculos

**Maturação:** semioprecoce / 7  
**Brolho de cor clara:** violeta vermelha  
**Cor da flor:** roxa  
**Número de bagas:** médio / 6  
**Folhagem - desenvolvimento inicial:** médio / 6  
**Folhagem - desenvolvimento final:** médio / 7  
**Folhagem - seletividade:** média / 6  
**Firmeza da folhagem:** bastante firme / 7

**Cor da polpa:** amarela clara / 6,5  
**Cor da pele:** amarela  
**Acabamento de pele:** boa / 7  
**Calibre dos tubérculos:** muito grande / 7  
**Forma dos tubérculos:** longa oval  
**Regularidade da forma:** bastante regular / 6,5  
**Tuberização:** muito alta / 7  
**Regularidade do calibre:** bastante regular / 6,5

### Sensibilidade e qualidade

**Dormência:** longa / 8  
**Metribuzina:** ligeiramente sensível a não sensível / 8  
**Bentazona:** bastante sensível / 6,5  
**Etileno:** 5% a 15% mais tubérculos / 6

**Segundos crescimentos:** bastante sensível / 6,5  
**Rachamentos:** ligeiramente sensível / 7  
**Manchas negras:** ligeiramente sensível / 7  
**Danos mecânicos:** ligeiramente sensível / 7

**Peso debaixo de água:** 354  
**Teor de matéria seca:** 19,4%  
**Distribuição da matéria seca:** excelente / 8  
**Nível TGA:** 5,2

**Qualidade para fritura em rodelas:** inadequada / 4  
**Qualidade para fritura em palitos:** média / 6  
**Grupo culinário:** firme / A  
**Descoloração em cru:** bastante sensível / 6  
**Descoloração após cozedura:** bastante sensível / 6



# COMO CULTIVAR

[www.agricopotatoes.com/pt/gourmandine](http://www.agricopotatoes.com/pt/gourmandine)

## Fertilização<sup>1</sup>

**Azoto:** conselho padrão + 10%.

**Fósforo:** conselho padrão.

**Potássio:** conselho padrão.

<sup>1</sup> O nível de fertilização é baseado na análise de solo.

## Tratamento da semente

Adequado pré-abrolhamento, após retirada do brolho principal, pode ter um impacto positivo na obtenção de um bom número de tubérculos. Desgrelar mais que uma vez pode ter um efeito negativo no rendimento e na regularidade do calibre.

## Distância de plantação

30/40 mm: 22 cm (60.500 plantas/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

## Ervas daninhas

Após a emergência, uma utilização padrão de metribuzina não provoca reações na folhagem ou perda de rendimento.

## Fungicidas

É necessário fazer um apertado calendário de tratamentos contra o míldio.

## Colheita

Devido à sua sensibilidade a manchas negras e danos mecânicos, esperar pelo menos 2 semanas para colher, após a aplicação do dessecante.

## Armazenamento

A temperatura preferencial de armazenamento é de 4°C. Adequada para períodos longos de armazenamento.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistências

**Nemátode dourado Ro 1/4:** - / -

**Nemátode dourado Ro 2/3:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 2:** - / -

**Nemátode, Globodera pallida Pa 3:** - / -

**Míldio da folha:** muito suscetível / 4,5

**Míldio do tubérculo:** ligeiramente suscetível / 6

**Sarna comum:** muito suscetível / 4,5

**Sarna pulverulenta:** ligeiramente suscetível / 6,5

**Fusarium:** ligeiramente suscetível / 6

**Erwinia:** muito suscetível / 4

**Antracnose:** suscetível / 5

**TRV:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus do enrolamento:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus - A:** ligeiramente suscetível a não suscetível / 9

**Vírus - X:** muito suscetível / 4

**Vírus - Yn:** ligeiramente suscetível / 6

**Vírus - Yntn (tubérculo):** ligeiramente suscetível / 6

**Verruga negra F1:** resistente\* / 10\*

**Verruga negra F6:** - / -

**Verruga negra F18:** - / -

Itens com asterisco (\*) são baseados na investigação da Agrico e não estão ainda oficialmente confirmados.