

Estelle (SW 10-8218).

MARKTSEGMENT



Een middenlaaf geelschillig consumptieras met pallida resistentie en een goede kiemrust.

- » Gele vleeskleur
- » Vastkokend
- » Goed onderwatergewicht



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
 Kruising: BELANA x AR 01-3576
 Zaailing: SW 10-8218
 Kwekersrecht: Aangevraagd

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaaf / 5,5
 Kiemkleur: rood
 Bloemkleur: wit
 Hoeveelheid bessen: geen / 4
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Vleeskleur: geel / 7
 Schilkleur: geel
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
 Knolgrootte: vrij grof / 7
 Knolvorm: ovaal
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
 Metribuzin: zeer gevoelig / 4,5
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: - / -
 Talent: - / -

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatting: weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht: 385
 Drogestofgehalte: 21%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 1,5

Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
 Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
 Kooktype: vastkokend / A
 Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

OM TE GROEIEN

www.agrico.nl/

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 15%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 15%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: vatbaar* / 3*

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Pa 3: partieel resistent / 7

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: - / -

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Yntn: - / -

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar / 1

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

* Resultaten met een '**' zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.