

# Twister.

Tidig färskpotatis eller för långlagring med bladmögel- och brunrötaresistens, lämplig för både ekologisk och konventionell odling. Twister är en av våra Next Generation sorter.

- ▶ Vackert utseende
- ▶ Bra lagringsduglighet
- ▶ Fast kokande

## MARKNADSSEGMENT



## EGENSKAPER

### Allmänna egenskaper

**Förädlare:** G.W. te Winkel  
**Korsning:** ARG 96-0739 x AR 02-9113  
**Nummersort:** TW 08-1507  
**Förädlarrätt:** 31-12-2048

### Växtens och knölens egenskaper

**Mognad:** medeltidig / 7  
**Ljus groddens färg:** röd-violet  
**Blomfärg:** ljuslila  
**Antal bär:** under genomsnittlig / 5,5  
**Blast - inledande utveckling:** ganska snabb / 7  
**Blast - slutlig utveckling:** ganska tidig / 7,5  
**Blast - renbarhet:** genomsnittlig / 6,5  
**Blast - styrka:** ganska tålig / 7

**Köttfärg:** ljusgul / 6,5  
**Skalfärg:** gul  
**Skalfinish:** bra / 7  
**Knölstorlek:** ganska stora / 7  
**Knölform:** rund oval  
**Knölens regelbundenhet:** jämn / 7  
**Knölsättning:** genomsnittligt / 6  
**Regelbundenhet i storleken:** ganska jämn / 6,5

### Känslighet och kvalitet

**Groningsvila:** ganska lång / 7  
**Metribuzin:** mycket känslig / 3  
**Bentazon:** ganska känslig / 6  
**Etylen:** 5 % färre knölar / 4

**Återväxt:** ganska känslig / 6,5  
**Växtsprickor:** ganska känslig / 6,5  
**Stöttblätt (inre blåmärken):** något till inte känslig / 8  
**Mekaniska skador:** något känslig / 7

**Undervattenvikt:** 345  
**Torrsubstanshalt:** 19%  
**Fördelning av torrsubstans:** - / -  
**TGA-nivå:** 5,63

**Chips kvalitet:** olämpligt / 4  
**Friterings kvalitet:** olämpligt / 5  
**Koktyp:** ganska fast / AB  
**Missfärgning efter råskalad:** ganska känslig / 6  
**Grå missfärgning (efter kokning):** ganska känslig / 6,5

[www.agriconordic.com](http://www.agriconordic.com)

# HUR MAN ODLAR

## Gödsling<sup>1</sup>

**Kväve:** standardgiva + 20 %.

**Fosfat:** standardgiva.

**Kalium:** standardgiva.

<sup>1</sup> Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

## Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Föredras att avgroddas en gång.

## Planteringsavstånd

28/35 mm: 22 cm (60.500 plantor/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

## Ogräs

Använd inte metribuzin (Sencor) efter uppkomst, eftersom det ger en allvarlig reaktion på blad och en allvarlig minskning av avkastningen.

## Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

## Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

## Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 6 °C. Lämplig för medel och lång lagring.

# Say potato, say Agrico.

## Motståndskraft

**Gul nematod Ro 1/4:** resistent / 9

**Gul nematod Ro 2/3:** - / -

**Vit nematod Pa 2:** - / -

**Vit nematod Pa 3:** - / -

**Bladmögel:** något till inte mottaglig / 9

**Brunröta:** något till inte mottaglig / 9

**Vanlig skorv:** något mottaglig / 6

**Pulverskorv:** mottaglig / 5

**Fusarium:** något mottaglig / 6

**Bakterios:** - / -

**Svartpricksjuka:** något mottaglig / 7

**Rost:** något mottaglig / 6

**Virus - Bladrull:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** - / -

**Virus - Yn:** något till inte mottaglig / 8

**Virus - Yntn (knöl):** något till inte mottaglig / 8

**Potatiskräfta ras 1:** måttligt mottaglig / 8

**Potatiskräfta ras 6:** - / -

**Potatiskräfta ras 18:** - / -