


Rousseau.

SEGMENT DE MARCHÉ



Variété primeur de conservation à peau rouge pour salade, avec une belle forme et un calibre très homogène.

- ▶ Tubérisation élevée
- ▶ Jolie peau
- ▶ Inscription officielle « chair ferme »



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Obtenteur : Lantmännen Seed B.V.
Croisement : CECILE x ROSAGOLD
Numéro de clone : SW 08-0012
Droits d'obteneur : 31-12-2049

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité : demi-hâtive / 6,5
Couleur du germe : rouge violet
Couleur de la fleur : violette
Nombre de baies : moyen / 6
Feuillage - développement initial : rapide / 8
Feuillage - développement final : bon / 8
Feuillage - épuration : plutôt facile / 7
Feuillage - tenue : plutôt ferme / 7

Couleur de la chair : jaune beurre / 6,5
Couleur de la peau : rouge
Finition de la peau : lisse / 7
Taille du tubercule : assez gros / 7
Forme du tubercule : oblong long
Régularité de la forme : régulière / 7
Tubérisation : élevée / 8
Homogénéité de la taille : assez régulière / 6,5

Sensibilité et qualité

Dormance : moyenne / 6
Métribuzine : assez sensible / 6
Bentazone : - / -
Éthylène : 5% de tubercules en moins / 4

Repousse : sensible / 5,5
Crevasses : peu sensible / 7
Coups bleus : peu sensible / 7,5
Endommagement à la récolte : peu sensible / 7,5

Poids sous eau : 378
Matière sèche : 20,6%
Répartition de la matière sèche : - / -
Niveau de glyco-alcaloïde : 5,9

Chipabilité : mauvaise / 4
Fritabilité : mauvaise / 4,5
Type de cuisson : assez ferme / AB
Grisaillement : sensible / 5
Noircissement après cuisson : peu sensible / 7



www.agrico.nl/fr/rousseau

PRODUCTION

Fertilisation¹

Azote : conseil standard.

Phosphore : conseil standard.

Potasse : conseil standard + 20%.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Traitement de semence

Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

30/40 mm : 20-22 cm (65.000 plantes/ha)

40/50 mm : 22-26 cm (55.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Conservation

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Nématode doré Ro 1/4 : résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3 : - / -

Nématode blanc Pa 2 : - / -

Nématode blanc Pa 3 : - / -

Mildiou du feuillage : très sensible / 4,5

Mildiou du tubercule : sensible / 5

Gale commune : peu sensible / 6

Gale poudreuse : peu sensible / 6,5

Fusariose : peu sensible / 6,5

Erwinia : - / -

Dartrose : peu à pas sensible / 8

Virus du mop top : très sensible / 4,5

Virus - Enroulement : - / -

Virus - A : - / -

Virus - X : - / -

Virus - Y : peu sensible / 7,5

Virus - Y nécrotique : peu sensible / 6

Galle verruqueuse F1 : - / -

Galle verruqueuse F6 : - / -

Galle verruqueuse F18 : - / -