

Marfona.

MARKTSEGMENT



Traditioneel

Retail
Vers

Een midden vroeg consumptieras met grove knollen, een hoge opbrengst en geschikt voor de 'baker'-markt.

- » Vrij vastkokend
- » Midden vroege rijptijd
- » Goede virusresistenties



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
Kruising: PRIMURA x KO 51-0123
Zaailing: KO 66-0384
Kwekersrecht: Verlopen

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars
Bloemkleur: wit
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7

Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij laag / 5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: vrij kort / 5,5
Metribuzin: weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon: - / -
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 349
Drogestofgehalte: 19,2%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: -

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6


www.agrico.nl/marfona

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies - 10%.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Fusarium: vatbaar / 5,5

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: vatbaar / 5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - A: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - X: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -