

Next Generation

Alouette.

Variedad semitardía de consumo, versátil, de piel roja, resistente al mildiu de la hoja y del tubérculo, adecuada para la producción convencional y ecológica.

- » Buena tolerancia a magulladuras
- » Adecuada para cocer y para frito casero
- » Buena tolerancia a la sequía



SEGMENTO DE MERCADO



CARACTERÍSTICAS

Características generales

Obtento: Agrico Research B.V.

Cruzamiento: AR 02-139-1 x LAURA

Plántula: AR 04-3153

Derechos de obtento: 31-12-2044

Características de la planta y del tubérculo

Madurez: semitardía / 6

Color claro del brote: rojo violeta

Color de la flor: morada clara

Número de bayas: ninguno / 4

Follaje - desarrollo inicial: rápido / 8

Follaje - desarrollo final: bueno / 8

Follaje - selectividad: media / 6

Follaje - firmeza: bastante firme / 7,5

Color de la carne: amarilla / 7,5

Color de la piel: roja

Finura de la piel: buena / 7

Tamaño de los tubérculos: bastante grande / 7

Forma de los tubérculos: oval largo

Regularidad de la forma de los tubérculos: regular / 7

Tuberización: media / 6

Regularidad del tamaño: bastante regular / 6,5

Sensibilidad y calidad

Dormancia: media / 6

Metribuzina: ligeramente sensible a no sensible / 8

Bentazona: ligeramente sensible / 7

Etileno: 5% menos tubérculos / 4

Crecimiento secundario: bastante sensible / 6,5

Grietas de crecimiento: bastante sensible / 6,5

Manchas negras (magulladuras internas): ligeramente sensible a no sensible / 8

Daños de recolección: bastante sensible / 6

Peso bajo agua: 389

Contenido de materia seca: 21,1%

Distribución de la materia seca: - / -

Nivel de TGA: 3,6

Calidad para chips: por encima de la media / 6,5

Calidad para patatas fritas: por encima de la media / 6,5

Tipo de cocción: bastante firme / AB

Coloración en crudo: ligeramente sensible / 7

Coloración gris (después de la cocción): ligeramente sensible / 7



www.agricopotatoes.com/es/alouette

CÓMO CULTIVAR

Fertilización¹

Nitrógeno: recomendación estándar + 10%.

Fósforo: recomendación estándar.

Potasio: recomendación estándar + 20%.

¹ El nivel de fertilización se basa en el análisis de suelo

Tratamiento de semillas

Es preferible sembrar los tubérculos en un suelo caliente, ya que el desarrollo inicial de esta variedad es lento. Una pregerminación adecuada después de quitar el brote apical puede dar un resultado positivo en la formación de los tubérculos. Quitar los brotes más de una vez puede tener un impacto negativo en el rendimiento y la regularidad del tamaño.

Distancia de plantación - calibre pequeño

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantas/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantas/ha)

Malas hierbas

El uso estándar de metribuzina (Sencor) en post-emergencia, no causa ninguna reacción en el follaje, ni reducción del rendimiento.

Fungicidas

A pesar de la resistencia al mildiu, hay que estar alerta a las infecciones.

Recolección

Debido a sus puntuaciones de sensibilidad a las manchas negras y/o los daños de recolección, hay que esperar al menos tres semanas después de la eliminación del follaje, antes de recolectar.

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento adecuada es de 5 °C. Para fines de transformación, no almacenar por debajo de los 7 °C. Adecuada para el almacenamiento a medio plazo.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistencias

Nematodo dorado Ro 1/4: resistente / 9

Nematodo dorado Ro 2/3: resistencia de campo / 8

Nematodo blanco Pa 2: - / -

Nematodo blanco Pa 3: - / -

Mildiu de la hoja: ligeramente a no sensible / 9

Mildiu del tubérculo: ligeramente a no sensible / 9

Sarna común: ligeramente sensible / 6

Sarna pulverulenta: ligeramente sensible / 6,5

Fusarium: ligeramente sensible / 7,5

Erwinia: - / -

Antracnosis: - / -

Spraing (Manchas y/o círculos necróticos): sensible / 5,5

Virus del enrollado: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: ligeramente sensible / 7

Virus - Yn: ligeramente a no sensible / 8

Virus - Yntn (tubérculo): ligeramente sensible / 7

Sarna verrugosa F1: resistente / 10

Sarna verrugosa F6: - / -

Sarna verrugosa F18: - / -