



Severina.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης

Μεσοπρώιμη, γενικής χρήσης με καλή απόδοση και λαμπερό φλοιό.

- ▶ Μεγάλοι κόνδυλοι
- ▶ Για όλους τους τύπους μαγειρέματος
- ▶ Ωραία εμφάνιση



Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Konst Research B.V.

Διασταύρωση: AR 00-0093 x MARIANNE

Σπορόφυτο: KO 08-1715

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2049

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη / 7

Χρώμα φύτρου: μπλέ βιολετί

Χρώμα άνθους: λευκό

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 4

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: αρκετά καλή / 7,5

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: καλή / 7

Μέγεθος κονδύλου: μεγάλο / 8

Σχήμα κονδύλου: οβάλ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5

Metribuzin (Sencor): αρκετά ευαίσθητη / 6

Bentazon: - / -

Αιθυλένιο: 5% λιγότεροι κόνδυλοι / 4

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: αρκετά ευαίσθητη / 6

Βάρος εντός νερού: 326

Στερεά ουσία: 18%

Κατανομή στερεάς ουσίας: - / -

Ποιότητα τσιπς: ακατάλληλη / 4

Τύπος μαγειρέματος (ψησίμο): ελαφρά σφικτή / AB

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: - / -

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6



agricopotatoes.gr/severina

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίπανση¹

Άζωτο: συνηθισμένη δοσολογία.

Φώσφορος: συνηθισμένη δοσολογία.

Κάλιο: συνηθισμένη δοσολογία +25%.

¹ Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 25 cm (60.500 φυτά/10 στρ.)

35/55 mm: 30 cm (54.000 φυτά/10 στρ.)

Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 4 °C. Κατάλληλη για άμεση χρήση ή μετά από σύντομο χρόνο αποθήκευσης.



Ανθεκτικότητα

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: ανθεκτική / 9

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περονόσπορος φύλλων: πολύ ευαίσθητη / 3,5

Περονόσπορος κονδύλων: ευαίσθητη / 5

Ακτινομύκωση: ευαίσθητη / 5,5

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστη ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ελάχιστη ευαίσθητη / 6,5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Ίωση- Spraing: πολύ ευαίσθητη / 4,5

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστη έως καθόλου ευαίσθητη / 8

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστη ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιερητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

