



## Palace.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γενικής Χρήσης



Ειδικής Χρήσης  
Για τυποποίηση



Βιομηχανικές  
Προτηγανισμένες/  
τηγάκι, Νιφάδες

Όψιμη, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για τηγάκι, προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους εδαφών.

- ▶ Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία
- ▶ Υποκίτρινη, μεγάλοι κόνδυλοι
- ▶ Εξαιρετική εμφάνιση, ικανοποιητικός χρόνος αποθήκευσης



### Γενικά Χαρακτηριστικά

Δημιουργός: Agrico Research B.V.

Διασταύρωση: AR 01-3350 x ADD 93-20902

Σπορόφυτο: AR 08-4241

Δικαιώματα Δημιουργού: 31-12-2049

### Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

Πρωιμότητα: όψιμη / 4,5

Χρώμα φύτρου: πρασινοκόκκινο

Χρώμα άνθους: μωβ

Αριθμός μούρων: μηδενικός / 4

Φύλλωμα - αρχική ανάπτυξη: αρκετά γρήγορη / 7,5

Φύλλωμα - τελική ανάπτυξη: καλή / 8

Φύλλωμα - ευρωστία φυτού: αρκετά συμπαγής / 7,5

Χρώμα σάρκας: υποκίτρινο / 6

Χρώμα φλοιού: κίτρινο

Εμφάνιση φλοιού: μέτρια / 6

Μέγεθος κονδύλου: αρκετά μεγάλο / 7,5

Σχήμα κονδύλου: οβάλ

Ομοιομορφία κονδύλων: κανονικό / 7

Κονδυλοποίηση: κανονική / 6

Κανονικότητα μεγέθους: αρκετά κανονικό / 6,5

### Ανθεκτικότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λήθαργος: αρκετά σύντομος / 5

Metribuzin (Sencor): ελάχιστη ευαισθητή / 7

Bentazon: - / -

Αιθυλένιο: 5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι / 6

Δευτερογενής ανάπτυξη: αρκετά ευαίσθητη / 6

Σκασίματα μεγέθους: αρκετά ευαίσθητη / 6,5

Εσωτερικές μαύρες κηλίδες: αρκετά ευαίσθητη / 6

Μηχανικοί χειρισμοί: ευαίσθητη / 5

Βάρος εντός νερού: 430

Στερεά ουσία: 23,2%

Κατανομή στερεάς ουσίας: κανονική / 6

Ποιότητα τσιπς: κανονική / 6

Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο): μαλακή / C

Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα: αρκετά ευαίσθητη / 6

Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα: ευαίσθητη / 5,5



agricopotatoes.gr/palace

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

### Λίπανση<sup>1</sup>

**Άζωτο:** συνηθισμένη δοσολογία -25%.

**Φώσφορος:** συνηθισμένη δοσολογία.

**Κάλιο:** συνηθισμένη δοσολογία +25%.

<sup>1</sup> Τα επίπεδα λίπανσης θα πρέπει να βασίζονται σε αναλύσεις εδάφους.

### Μεταχείριση σπόρου

Μπορεί να φυτευτεί κατ' ευθείαν από την ψύξη, μετά από σύντομο θερμικό σοκ. Εάν απαιτηθεί σπάσιμο των φύτρων, δεν πρέπει να γίνει πάνω από μία φορά, γιατί μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην απόδοση και την κανονικότητα του μεγέθους.

### Απόσταση φύτευσης

28/35 mm: 24-27 cm (50.000 φυτά/10 στρ.)

35/50 mm: 32-35 cm (40.000 φυτά/10 στρ.)

50/55 mm: 38-40 cm (33.000 φυτά/10 στρ.)

### Ζιζάνια

Η ενδεδειγμένη χρήση του metribuzin (Sencor), μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς το φύλλωμα αλλά σπάνια προκαλεί μείωση της παραγωγής.

### Μυκητοκτόνα

Αυστηρό προληπτικό πρόγραμμα ψεκασμού κατά του περονόσπορου είναι απαραίτητο.

### Μηχανικοί χειρισμοί

Αναμονή τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την αποφύλλωση, λόγω ευαισθησίας στους μηχανικούς χειρισμούς και στις εσωτερικές μαύρες κηλίδες.

### Αποθήκευση

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στους 5 °C. Για βιομηχανική χρήση, να μην αποθηκεύεται κάτω από τους 7 °C. Κατάλληλη για μέσο ή μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.



### Ανθεκτικότητα

Χρυσονηματώδεις Ro 1/4: - / -

Χρυσονηματώδεις Ro 2/3: - / -

Νηματώδης Pa2: - / -

Νηματώδης Pa3: - / -

Περονόσπορος φύλλων: ευαίσθητη / 5

Περονόσπορος κονδύλων: ελάχιστα ευαίσθητη / 6,5

Ακτινομύκωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Σπογγοσπορίωση: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Φουζάριο: ευαίσθητη / 5,5

Erwinia: - / -

Εξωτερικά μαύρα στίγματα: ευαίσθητη / 5

Ίωση- Spraing: ευαίσθητη / 5,5

Ίωση - LRV: - / -

Ίωση - A: - / -

Ίωση - X: - / -

Ίωση - Yn: ελάχιστα ευαίσθητη / 7,5

Ίωση - Yntn (κονδύλου): ελάχιστα ευαίσθητη / 6

Καρκίνωση 1: - / -

Καρκίνωση 6: - / -

Καρκίνωση 18: - / -

Η Τεχνοφάρμα είναι επίσημος συνεργάτης της Agrico. Οι πληροφορίες του παρόντος, αφορούν στη γενική εικόνα, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας σε διάφορες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και δεν αποτελούν οδηγό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου Γεωπόνου. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές σχετιζόμενες με τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος, δεδομένου ότι σε κάθε χώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από διαφορετικές κλιματικές, εδαφολογικές και λοιπές τοπικές συνθήκες, καλλιερητικούς τρόπους, συμβουλές και συνήθειες. Η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ έχουν λάβει όλες τις εύλογες προνοιες για τη σύνταξη του παρόντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να μεταβληθούν και η AGRICO και η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

