

Rudolph.

MARKTSEGMENT



Een middenlaat, roodschillig en witvlezig consumptieras met een goede hitteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- » Witte vleeskleur
- » Grove knollen
- » Goede bewaarbaarheid



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico UK
 Kruising: CHIEFTAIN x STIRLING
 Zaailing: UK 93-1-2
 Kwekersrecht: 31-12-2035

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenlaat / 5,5
 Kiemkleur: rood paars
 Bloemkleur: licht paars
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - selecteerbaarheid: gemiddeld / 6,5
 Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Vleeskleur: wit / 4
 Schilkleur: rood
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolgrootte: grof / 8
 Knolvorm: ovaal rond
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
 Knolzetting: vrij laag / 5
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: lang / 8
 Metribuzin: redelijk gevoelig / 6
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatiging: redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht: 376
 Drogestofgehalte: 20,5%
 Drogestofverdeling: - / -
 TGA-gehalte: 5,5

Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Rauwverkleuring: - / -
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5


www.agrico.nl/rudolph

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%. Bij voorkeur een gedeelde gift en, de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 24-27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 32-35 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: - / -

Aardappelmoeheid Ro 2/3: - / -

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Erwinia: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: vatbaar / 5

Virus - Yntn: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): - / -