

Danique.

MARKTSEGMENT



Een midden vroeg, vrij vastkokend tafelras met een mooie huid en een goed onderwatergewicht.

- » **Prachtige uitstraling**
- » **Midden vroege rijptijd**
- » **Brede resistenties**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 99-1184 x AR 98-1009
Zaailing: AR 05-1176
Kwekersrecht: 31-12-2046

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars
Bloemkleur: licht paars
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - selecteerbaarheid: matig / 5
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilkleur: geel
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Knolvorm: ovaal rond
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 8
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust: gemiddeld / 6
Metribuzin: weinig gevoelig / 7,5
Bentazon: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 25% meer knollen / 8

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht: 366
Drogestofgehalte: 20%
Drogestofverdeling: - / -
TGA-gehalte: 3,07

Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Kooktype: vrij kruimig / B
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7


www.agrico.nl/danique

OM TE GROEIEN

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

¹ Level of fertilization is based on soil analysis

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4: resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3: vatbaar / 4

Aardappelmoeheid Pa 2: - / -

Aardappelmoeheid Pa 3: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: vatbaar / 5

Fusarium: vatbaar / 5

Erwinia: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Virus - Bladrol: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -