

Agria.

Kasna sorta žute boje mesa, dobrog prinosa i postojane kvalitete.

- ▶ Izvrsna kvaliteta za prženje
- ▶ Otporan na više tipova virusa
- ▶ Dobro skladištenje

TRŽIŠNA NAMJENA




Tradicionalna



Maloprodaja
Svježa



Prerada
Pogodan za
preradu, prženi
krumpirići, čips



KARAKTERISTIKE

Opće karakteristike

Uzgajivač: Böhm
Križanje: QUARTA x SEMLO
Sjeme: BM 77-0945

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: kasna berba / 5
Boja klice: plavo ljubičasta
Boja cvijeta: bijela
Broj bobica: vrlo visok / 8
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7

Boja mesa: žuta / 7
Boja pokožice: žuta
Glatkoća pokožice: prosječan / 6
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Oblik gomolja: ovalno izduženi
Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7
Tuberizacija: umjereno mali / 5
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: duga / 8
Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5
Bentazon: umjereno osjetljiv / 6,5

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6
Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5

Podvodna težina: 402
Postotak suhe tvari: 21,8%
Raspodjela suhe tvari: prosječna / 6,5
TGA razina: 2,7

Čips kvaliteta: dobar / 7
Kvaliteta prženih krumpirića: izvrstan / 8
Kulinarski tip: brašnast / BC
Oksidacija sirovog krumpira: malo osjetljiv / 7
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7



KAKO UZGOJITI

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Postupanje sa sjemenom

Preporučuje se kratak toplinski šok (zagrijavanje) ili pravilno naklijavanje. Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja.

Razmak sadnje

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću, ali rijetko utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Preporučuje se preventivni raspored prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za dugotrajno skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: osjetljiv / 2

Nematoda Pa 3: osjetljiv / 2

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5,5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 7

Obična krastavost: vrlo osjetljiv / 4,5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 3

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Erwinia (crna noga): - / -

Nagnječenje: - / -

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6

Virus - A: umjereno do neosjetljiv / 9

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: malo osjetljiv / 9

Bradavičasta bolest krumpira F6: prilično osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -