

Next Generation

Jacky.

Fastkokande sort med en väldigt hög knölsättning som ger många småfallande knölar, är bladmögel- och brunrötaresistent. Jacky är en av våra Next Generation sorter.

- ▶ Något mjölig
- ▶ Hög knölsättning
- ▶ God tolerans mot stöttblått och mekaniska skador

MARKNADSSEGMENT



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Förädlare: Lantmännen Seed B.V.

Korsning: ANOUK x ATHLETE

Nummersort: SW 09-0557

Förädlarrätt: 31-12-2049

Växtens och knölens egenskaper

Mognad: medeltidig / 6,5

Ljus groddens färg: grön-röd

Blomfärg: ljuslila

Antal bär: över genomsnittlig / 6,5

Blast - inledande utveckling: ganska snabb / 7,5

Blast - slutlig utveckling: ganska tidig / 7,5

Blast - rensharhet: ganska lätt / 7

Blast - styrka: ganska tålig / 7

Köttfärg: ljusgul / 6,5

Skalfärg: gul

Skalfinish: över genomsnittlig / 6,5

Knölstorlek: normal / 6,5

Knölform: rund oval

Knölens regelbundenhet: ganska jämn / 6,5

Knölsättning: hög / 9

Regelbundenhet i storleken: ganska jämn / 6

Känslighet och kvalitet

Groningsvila: ganska kort / 5,5

Metribuzin: något till inte känslig / 8

Bentazon: - / -

Etylen: 15-25 % fler knölar / 7

Återväxt: ganska känslig / 6

Växtsprickor: ganska känslig / 6,5

Stöttblått (inre blåmärken): något till inte känslig / 8

Mekaniska skador: något till inte känslig / 8

Undervattenvikt: 368

Torrsubstanshalt: 20,1%

Fördelning av torrsubstans: bra / 7

TGA-nivå: 12,74

Chips kvalitet: olämpligt / 5

Friterings kvalitet: under genomsnittet / 5,5

Koktyp: något mjölig / B

Missfärgning efter råskalad: ganska känslig / 6

Grå missfärgning (efter kokning): ganska känslig / 6,5


www.agriconordic.com

HUR MAN ODLAR

Gödsling¹

Kväve: standardgiva.

Fosfat: standardgiva.

Kalium: standardgiva.

¹ Gödslingsnivån baseras på jordanalysen.

Behandling av utsäde

Kan planteras direkt från kylan, helst efter en kort snabb väckning. Att ta bort groddar kan ha en negativ effekt på avkastningen och storleken.

Planteringsavstånd

28/35 mm: 20 cm (67.000 plantor/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plantor/ha)

Ogräs

Efter uppkomst ger en standardanvändning av metribuzin (Sencor) inte någon reaktion på blad eller minskad avkastning.

Svampbekämpningsmedel

Trots resistensen mot bladmögel bör du vara uppmärksam på infektioner.

Mekaniska skador

På grund av att den är känslig för stöttblått och/eller skördeskador bör man vänta med att skörda minst två veckor efter blastdödning.

Lagring

Förvaringstemperaturen är helst 5 °C. Lämplig för medellång lagring.

Say potato,
say **Agrico.**

Motståndskraft

Gul nematod Ro 1/4: resistent / 9

Gul nematod Ro 2/3: - / -

Vit nematod Pa 2: - / -

Vit nematod Pa 3: - / -

Bladmögel: något till inte mottaglig / 9

Brunröta: något till inte mottaglig / 9

Vanlig skorv: mottaglig / 5,5

Pulverskorv: mycket mottaglig / 2

Fusarium: mottaglig / 5,5

Bakterios: - / -

Svartpricksjuka: något mottaglig / 6

Rost: något mottaglig / 6

Virus - Bladrull: - / -

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: mottaglig / 5

Virus - Yntn (knöl): något till inte mottaglig / 8

Potatiskräfta ras 1: - / -

Potatiskräfta ras 6: - / -

Potatiskräfta ras 18: - / -