

# Chateau.

SEGMENT DE MARCHÉ



Variété de consommation pour salade, précoce, avec une bonne tubérisation et une bonne teneur en matière sèche.

- ▶ Peau d'excellente qualité
- ▶ Inscription officielle « chair ferme »
- ▶ Tubérisation élevée



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

**Obtenteur** : Agrico Research B.V.  
**Croisement** : MA 98-0322 x AR 98-0341  
**Numéro de clone** : AR 05-1443  
**Droits d'obteneur** : 31-12-2046

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

**Maturité** : hâtive / 7,5  
**Couleur du germe** : bleu violet  
**Couleur de la fleur** : blanche  
**Nombre de baies** : assez faible / 5,5  
**Feuillage - développement initial** : plutôt rapide / 7,5  
**Feuillage - développement final** : bon / 8  
**Feuillage - épuration** : plutôt facile / 7  
**Feuillage - tenue** : plutôt ferme / 7

**Couleur de la chair** : jaune beurre / 6,5  
**Couleur de la peau** : jaune  
**Finition de la peau** : lisse / 7  
**Taille du tubercule** : assez gros / 7  
**Forme du tubercule** : oblong long  
**Régularité de la forme** : régulière / 7  
**Tubérisation** : élevée / 8  
**Homogénéité de la taille** : régulière / 7

### Sensibilité et qualité

**Dormance** : moyenne / 6  
**Métribuzine** : assez sensible / 6  
**Bentazone** : peu sensible / 7,5  
**Éthylène** : 5% à 15% de tubercules en plus / 6

**Repousse** : assez sensible / 6,5  
**Crevasses** : assez sensible / 6,5  
**Coups bleus** : peu à pas sensible / 8  
**Endommagement à la récolte** : sensible / 5

**Poids sous eau** : 350  
**Matière sèche** : 19,2%  
**Répartition de la matière sèche** : - / -  
**Niveau de glyco-alcaloïde** : 4,2

**Chipabilité** : mauvaise / 4  
**Fritabilité** : mauvaise / 4  
**Type de cuisson** : assez ferme / AB  
**Grisaillement** : peu sensible / 7,5  
**Noircissement après cuisson** : peu sensible / 7,5



[www.agrico.nl/fr/chateau](http://www.agrico.nl/fr/chateau)

# PRODUCTION

## Fertilisation<sup>1</sup>

**Azote** : conseil standard.

**Phosphore** : conseil standard.

**Potasse** : conseil standard + 20%.

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

## Densité de plantation

30/40 mm : 23 cm (58.000 plantes/ha)

40/50 mm : 26 cm (51.500 plantes/ha)

## Dés herbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine (Sencor) peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

## Fongicides

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

En raison de ses scores de sensibilités à la maladie du point noir et/ou aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

## Conservation

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Résistances

**Nématode doré Ro 1/4** : résistante / 9

**Nématode doré Ro 2/3** : - / -

**Nématode blanc Pa 2** : - / -

**Nématode blanc Pa 3** : - / -

**Mildiou du feuillage** : très sensible / 4

**Mildiou du tubercule** : sensible / 5,5

**Gale commune** : sensible / 5,5

**Gale poudreuse** : très sensible / 2

**Fusariose** : peu sensible / 7

**Erwinia** : - / -

**Dartrose** : très sensible / 4,5

**Virus du mop top** : sensible / 5

**Virus - Enroulement** : - / -

**Virus - A** : - / -

**Virus - X** : - / -

**Virus - Y** : peu sensible / 7

**Virus - Y nécrotique** : peu sensible / 6,5

**Galle verruqueuse F1** : peu sensible / 8

**Galle verruqueuse F6** : - / -

**Galle verruqueuse F18** : - / -