

# Riviera.

TRŽIŠNA NAMJENA



Tradicionalna

Maloprodaja  
Svježa

Vrlo rana sorta atraktivne pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, dobre otpornosti na viruse i dobrog prinosa.

- ▶ Krupni gomolji
- ▶ Lijep izgled
- ▶ Dobra otpornost na viruse



## KARAKTERISTIKE

### Opće karakteristike

Uzgajivač: Mts. Boerhave

Križanje: MINERVA x ALCMARIA

Sjeme: BH 86-0266

### Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: vrlo rana berba / 8

Boja klice: plavo ljubičasta

Boja cvijeta: bijela

Broj bobica: nema / 4

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: prosječno / 7

Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6,5

Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6,5

Boja mesa: svjetložuta / 6

Boja pokožice: žuta

Glatkoća pokožice: izvrstan / 8

Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5

Oblik gomolja: ovalno okrugli

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6

Tuberizacija: umjereno mali / 5

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

### Osjetljivost i kvaliteta

Dormantnost: prosječna / 6

Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Bentazon: - / -

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5

Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8

Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6

Podvodna težina: 318

Postotak suhe tvari: 17,7%

Raspodjela suhe tvari: - / -

TGA razina: 4,8

Kulinarski tip: umjereno čvrst / AB

Oksidacija sirovog krumpira: - / -

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): osjetljiv / 5,5



# KAKO UZGOJITI

## Gnojidba<sup>1</sup>

**Dušik:** standardne preporuke + 10%.

**Fosfat:** standardne preporuke.

**Kalij:** standardne preporuke.

<sup>1</sup> Gnojidba se temelji na analizi tla

## Postupanje sa sjemenom

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

## Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

## Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

## Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

## Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

## Skladištenje

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 4 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



# Say potato, say Agrico.

## Otpornosti

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan\* / 9\*

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 3

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Obična krastavost: osjetljiv / 5,5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): osjetljiv / 5

Nagnječenje: osjetljiv / 5,5

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 7

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn: umjereno osjetljiv / 7

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

\* Rezultati označeni zvjezdicom (\*) temelje se na našem vlastitom istraživanju i još nisu službeno objavljeni.