

Vogue.

Втора ранна група сорт с еднакви по размер големи клубени.



традиционни
Традиционен

- ▶ Остава твърд при готвене
- ▶ Големи клубени
- ▶ Ранно клубенообразуване



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Konst Research B.V.
Кръстоска: MARABEL x AMOROSA
Селекционни права: 31-12-2046
Посадъчен материал: KO 03-2027

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: втора ранна / 6,5
Светъл цвят на кълновете: зелен червен / GR
Цвят на цветовете: бял / W
Брой на плодовете: много висока / 4
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7
Листа - крайно развитие: доста добро / 7,5
Листа - твърдост: доста твърдо / 7
Листа - селективност: средно / 6
Цвят на кожицата: жълт / Y
Цвят на месото: жълт / 7
Повърхност на кожата: средно / 6
Форма на клубена: овално продълговата / OL
Изравненост на формата на клубена: редовна / 7
Клубенообразуване: средно / 6
Размер на клубените: голям / 8
Изравненост на размера: редовна / 7
Период на покой: сравнително кратък / 5

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8
Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6
Метрибузин - преди поникване: леко до нечувствителен / 8
Метрибузин - след поникване: леко чувствителен / 7,5
Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7
Етилен: 5% по-малко до 5% повече клубени / 5
Тегло под вода: 311
Съдържание на сухо вещество: 17,3%
Вид на готвене: по-скоро твърд / AB
Обезцветяване след готвене: леко чувствителен / 7,5
Качество на пържените картофи: неподходящ / 5
Качество на хрупкавост: неподходящ / 4
ниво TGA: 3,7
Карвоново масло: 25% повече клубени / 8
S_Dormancy: сравнително кратък / 5

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет - 10%. За предпочитане е да се прилага разделено на части, като второто третиране се извършва скоро след клубенообразуването.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 10%.

Третиране на семената

Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60 500 растения/ха)

35/45 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) не води до реакция на листата или намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне три седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. Подходящ за доставка направо от полето или за краткосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко податлив / 6,5

Вирус - Yntn (клубени): податливи / 5

Spraing: много податлив / 4

Късна мана - по листата: много податлив / 4

Късна мана - клубени: слабо чувствителни / 6

Fusarium: леко податлив / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Обикновена краста/струпяване: слабо чувствителни / 6

Прашеста краста / струпяване: много податлив / 2

Вирус - X: леко до нечувствителен / 8

Черна петна: много податлив / 4,5

Рак F1: леко податлив / 9

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9