

Agria.

Основна култура, жълто месо, сорт за преработка, с добър добив и много стабилно качество.

- » Отлично качество на пържене
- » Устойчивост на множество вируси
- » Добра съхраняемост



**органични
продукти**
Органично



преработка
Пържени
картофи
Чипс
Универсален



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



традиционни
Традиционен



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Böhm

Кръстоска: QUARTA x SEMLO

Селекционни права: изтекли

Посадъчен материал: BM 77-0945

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: основна култура / 5

Светъл цвят на кълновете: синьо виолетово / BV

Цвят на цветовете: бял / W

Брой на плодовете: няма / 8

Листа - първоначално развитие: избързващ / 7

Листа - крайно развитие: добро / 8

Листа - твърдост: доста твърдо / 7

Листа - селективност: лесно / 7

Цвят на кожата: жълт / Y

Цвят на месото: жълт / 7

Повърхност на кожата: средно / 6

Форма на клубена: овално продълговата / OL

Изравненост на формата на клубена: редовна / 7

Клубенообразуване: сравнително ниско / 5

Размер на клубените: голям / 8

Изравненост на размера: редовна / 7

Период на покой: дълъг / 8

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6

Черни петна (вътрешни натъртвания): средно чувствителен / 6

Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5

Повреди по реколтата: чувствителен / 5

Метрибузин - преди поникване: леко чувствителен / 7,5

Метрибузин - след поникване: леко чувствителен / 7,5

Бентазон / Bentazon: средно чувствителен / 6,5

Етилен: 5% до 15% повече клубени / 6

Тегло под вода: 402

Съдържание на сухо вещество: 21,8%

Вид на готвене: брашнест / BC

Обезцветяване след готвене: леко чувствителен / 7

Обезцветяване на суровината: леко чувствителен / 7

Качество на пържените картофи: отличен / 8

Разпределение на сухото вещество: средна / 6,5

Качество на хрупкавост: добър / 7

ниво TGA: 2,7

Карвоново масло: 25% повече клубени / 8

S_Dormancy: дълъг / 8



How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет - 10%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 10%.

Третиране на семената

Препоръчва се кратък топлинен шок или подходящо предварително покълване. Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълм може да даде положителен резултат за залагането на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

35/55 mm: 30 cm (45 000 растения/ха)

50/55 mm: 40 cm (33 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата, но рядко до намаляване на добива.

Фунгициди

Препоръчва се превантивно пръскане срещу late blight/късна мана

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне три седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. За целите на обработката не съхранявайте под 7 °C. Подходящ за дългосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Листно свиване: слабо чувствителни / 6

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко податлив / 7

Spraing: леко податлив / 7

Късна мана - по листата: податливи / 5,5

Късна мана - клубени: леко податлив / 7

Fusarium: леко податлив / 6,5

Обикновена краста/струпяване: много податлив / 4,5

Say potato,
say **Agrico.**

Прашеста краста / струпяване: много податлив / 3

Вирус - A: леко до слабо възприемчив / 9

Вирус - X: леко до нечувствителен / 8

Рак F1: леко податлив / 9

Рак F6: доста податлив / 6

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9

Бяла нематода Pa 2: чувствителен / 2

Бяла нематода Pa 3: чувствителен / 2