

Alouette.

Ранен сорт за основна култура, универсален, с червена кожаца, с устойчивост на късна мана по листата и клубените, подходящ за конвенционално и биологично производство.

- ▶ **Добра поносимост към натъртване**
- ▶ **Подходящ за готвене и домашно печени продукти**
- ▶ **Добра устойчивост на суша**



**органични
продукти**
Органично



преработка
Универсален



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



традиционни
Традиционен



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.
Кръстоска: AR 02-139-1 x LAURA
Селекционни права: 31-12-2044
Посадъчен материал: AR 04-3153

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: ранна основна култура / 6
Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV
Цвят на цветовете: светло лилав / LP
Брой на плодовете: много висока / 4
Листа - първоначално развитие: бърз / 8
Листа - крайно развитие: добро / 8
Листа - твърдост: доста твърдо / 7,5
Листа - селективност: средно / 6
Цвят на кожицата: червен / R
Цвят на месото: жълт / 7,5
Повърхност на кожата: добро / 7
Форма на клубена: овално продълговата / OL
Изравненост на формата на клубена: редовна / 7
Клубенообразуване: средно / 6
Размер на клубените: сравнително голям / 7
Изравненост на размера: съвсем редовна / 6,5
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8
Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6
Метрибузин - преди поникване: леко чувствителен / 7,5
Метрибузин - след поникване: леко чувствителен / 7
Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7
Етилен: 5% по-малко клубени / 4
Тегло под вода: 389
Съдържание на сухо вещество: 21,1%
Вид на готвене: по-скоро твърд / AB
Обезцветяване след готвене: леко чувствителен / 7
Обезцветяване на суровината: леко чувствителен / 7
Качество на пържените картофи: над средното ниво / 6,5
Качество на хрупкавост: - / -
ниво TGA: 3,6
Карвоново масло: 5% до 15% повече клубени / 6
S_Dormancy: средно / 6
Степен на мутация: Този сорт може да се отличава с висока степен на мутация. Поради това използването на карвоново масло не се препоръчва. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 10%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 20%.

Третиране на семената

За предпочитане е да засадите клубените в топла почва, тъй като първоначалното развитие на този сорт е бавно. Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

35/55 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) не води до реакция на листата или намаляване на добива.

Фунгициди

Въпреки устойчивостта на late blight/късна мана, останете нащрек за инфекции.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне три седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. За целите на обработката не съхранявайте под 7 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко податлив / 7

Spraing: податливи / 5,5

Късна мана - по листата: леко до слабо възприемчив / 9

Късна мана - клубени: леко до слабо възприемчив / 9

Fusarium: леко възприемчив / 7,5

Say potato,
say Agrico.

Обикновена краста/струпяване: слабо чувствителни / 6

Прашеста краста / струпяване: леко податлив / 6,5

Вирус - X: леко податлив / 7

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9

Златна нематода Ro 2/3: устойчив на полето / 8

R_Golden nematode Ro 5: умерено възприемчив* / 6*