

Arizona.



традиционни
Традиционен

Втора ранна група по зрялост сорт,
който дава високи добиви при различни
климатични условия.

- » Еднаква форма и размер на клубените
- » Добра устойчивост на суша
- » Устойчивост на множество вируси



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.
Кръстоска: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Селекционни права: 31-12-2040
Посадъчен материал: AR 98-0313

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: втора ранна / 6,5
Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV
Цвят на цветовете: бял / W
Брой на плодовете: над средното / 5
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7
Листа - крайно развитие: добро / 8
Листа - твърдост: средно / 6
Листа - селективност: средно / 6,5
Цвят на кожицата: жълт / Y
Цвят на месото: светло жълт / 6
Повърхност на кожата: добро / 7
Форма на клубена: овална / O
Изравненост на формата на клубена: редовна / 7,5
Клубенообразуване: средно / 6
Размер на клубените: голям / 8
Изравненост на размера: редовна / 7
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: леко чувствителен / 7
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко чувствителен / 7
Растежни пукнатини: леко чувствителен / 7
Повреди по реколтата: леко чувствителен / 7
Метрибузин - преди поникване: чувствителен / 5
Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6,5
Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7
Етилен: 15% до 25% повече клубени / 7
Тегло под вода: 301
Съдържание на сухо вещество: 17%
Вид на готвене: по-скоро твърд / AB
Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6,5
Качество на пържените картофи: неподходящ / 4
Качество на хрупкавост: неподходящ / 4
ниво TGA: 4,2
Карвоново масло: 5% до 15% повече клубени / 6
S_Dormancy: средно / 6

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет - 10%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)

35/55 mm: 30 cm (45 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване не използвайте метрибузин (Sencor), тъй като той предизвиква тежка реакция на листата и сериозно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко до нечувствителен / 8

Spraing: податливи / 5

Късна мана - по листата: много податлив / 4

Късна мана - клубени: податливи / 5

Fusarium: слабо чувствителни / 6

Обикновена краста/струпяване: податливи / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Пращеста краста / струпяване: много податлив / 2

Вирус - X: леко до нечувствителен / 8

Черна петна: много податлив / 4

Erwinia: слабо чувствителни / 6

Рак F1: устойчив / 10

Рак F6: доста податлив / 6

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9