

Artemis.

Втори ранен сорт с отличен добив и идеален за домашно пържене.


- ▶ Отлично качество на пържене
- ▶ Добра устойчивост на натъртване и увреждане
- ▶ Многобройна устойчивост



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



**традиционни
Традиционен**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.

Кръстоска: RIANITA x RENSKA

Селекционни права: 31-12-2029

Посадъчен материал: AR 87-0039

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: втора ранна / 7

Светъл цвят на кълновете: зелен / G

Цвят на цветовете: бял / W

Брой на плодовете: много висока / 4

Листа - първоначално развитие: избързващ / 7,5

Листа - крайно развитие: средно / 7

Листа - твърдост: средно / 6

Листа - селективност: лесно / 7

Цвят на кожата: жълт / Y

Цвят на месото: светло жълт / 6

Повърхност на кожата: добро / 7

Форма на клубена: овално продълговата / OL

Изравненост на формата на клубена: редовна / 7

Клубенообразуване: доста високо / 7

Размер на клубените: сравнително голям / 7

Изравненост на размера: редовна / 7

Период на покой: сравнително кратък / 5,5

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5

Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8

Растежни пукнатини: леко чувствителен / 7

Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6,5

Метрибузин - преди поникване: средно чувствителен / 6

Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6

Тегло под вода: 375

Съдържание на сухо вещество: 20,4%

Вид на готвене: по-скоро брашнест / B

Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6

Качество на пържените картофи: средно / 6

Качество на хрупкавост: средно / 6

ниво TGA: 4,9

Карвоново масло: 15% до 25% повече клубени / 7

S_Dormancy: сравнително кратък / 5,5

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 10%.
Фосфат: стандартен съвет
Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

За предпочитане е да засадите клубените в топла почва, тъй като първоначалното развитие на този сорт е бавно. Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)
35/55 mm: 33 cm (40 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата и известно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. За целите на обработката не съхранявайте под 7 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Листно свиване: леко податлив / 7
Вирус - Yn: леко податлив / 6,5
Вирус - Yntn (клубени): леко до нечувствителен / 8
Spraing: слабо чувствителни / 6
Късна мана - по листата: податливи / 5
Късна мана - клубени: леко до нечувствителен / 8
Fusarium: податливи / 5

Say potato,
say Agrico.

Обикновена краста/струпяване: податливи / 5,5
Пращеста краста / струпяване: податливи / 5,5
Вирус - X: податливи / 5,5
Черна петна: леко податлив / 7
Erwinia: слабо чувствителни / 6
Рак F1: устойчив / 10
Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9