

# Levante.

Ранен сорт за основна култура, високодобивен, с хубава жълта кожа и устойчивост на късна мана по листата и клубените.

- Висока степен на клубенизация
- Добро покритие на кожата
- Добра съхраняемост



**органични  
продукти**  
Органично



**търговия  
на  
дребно  
Пресен  
пазар**



**традиционни**  
Традиционен



## characteristics

### Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.  
Кръстоска: AR 01-3218 x ALMERA  
Селекционни права: 31-12-2048  
Посадъчен материал: AR 07-3009

### Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: ранна основна култура / 5,5  
Светъл цвят на кълновете: зелен червен / GR  
Цвят на цветовете: бял / W  
Брой на плодовете: над средната / 5,5  
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7  
Листа - крайно развитие: добро / 8  
Листа - твърдост: доста твърдо / 7  
Листа - селективност: средно / 6  
Цвят на кожата: жълт / Y  
Цвят на месото: светло жълт / 6  
Повърхност на кожата: добро / 7  
Форма на клубена: продълговато овална / LO  
Изравненост на формата на клубена: съвсем редовна / 6,5  
Клубенообразуване: високо / 8  
Размер на клубените: сравнително голям / 7  
Изравненост на размера: редовна / 7  
Период на покой: средно / 6,5

### Чувствителност и качество

Вторичен растеж: леко чувствителен / 7  
Черни петна (вътрешни натъртвания): средно чувствителен / 6,5  
Растежни пукнатини: леко чувствителен / 7  
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6  
Метрибузин - преди поникване: средно чувствителен / 6,5  
Метрибузин - след поникване: чувствителен / 5,5  
Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7  
Етилен: 5% по-малко клубени / 4  
Тегло под вода: 365  
Съдържание на сухо вещество: 19,9%  
Вид на готвене: по-скоро брашнест / B  
Обезцветяване след готвене: леко чувствителен / 7  
Обезцветяване на суровината: чувствителен / 5,5  
Качество на пържените картофи: под средното ниво / 5,5  
Качество на хрупкавост: неподходящ / 4,5 ниво TGA: 4,73  
Карвоново масло: 5% до 15% повече клубени / 6  
S\_Dormancy: средно / 6,5

# How to grow

## Наторяване и третиране на семената <sup>1</sup>

**Азот:** стандартен съвет За предпочитане е да се прилага разделено на части, като второто третиране се извършва скоро след клубенообразуването.

**Фосфат:** стандартен съвет

**Калий:** стандартен съвет

## Третиране на семената

За предпочитане е да засадите клубените в топла почва, тъй като първоначалното развитие на този сорт е бавно. Отстраняването на кълновете може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените. Препоръчва се кратък топлинен шок или подходящо предварително покълване.

## Planting distance

Level of fertilization is based on soil analysis.

28/35 mm: 22 cm (60 500 растения/ха)

35/55 mm: 27 cm (49 500 растения/ха)

## Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) не води до реакция на листата или намаляване на добива.

## Фунгициди

Въпреки устойчивостта на late blight/късна мана, останете нащрек за инфекции.

## Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне три седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

## Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за средно до дългосрочно съхранение.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Устойчивост

**Вирус - Yn:** слабо чувствителни / 6

**Вирус - Yntn (клубени):** леко до слабо възприемчив / 8,5

**Spraing:** много податлив / 4,5

**Късна мана - по листата:** леко до слабо възприемчив / 8,5

**Късна мана - клубени:** леко възприемчив / 7,5

**Fusarium:** слабо чувствителни / 6

**Обикновена краста/струпяване:** податливи / 5

**Прашеста краста / струпяване:** леко податлив / 6,5

**Черна петна:** леко възприемчив / 7,5

**Златна нематода Ro 1/4:** устойчив / 9