

Riviera.



традиционни
Традиционен

Първи ранен сорт с атрактивна кожа,
отлична топлоустойчивост, добра
устойчивост на вируси и ранен добър
добив.

- **Големи клубени**
- **Красив външен вид**
- **Добра устойчивост на вируси**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Mts. Boerhave
Кръстоска: MINERVA x ALCMARIA
Селекционни права: 31-12-2030
Посадъчен материал: BH 86-0266

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: първа ранна / 8
Светъл цвят на кълновете: синьо виолетово / BV
Цвят на цветовете: бял / W
Брой на плодовете: много висока / 4
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7
Листа - крайно развитие: средно / 7
Листа - твърдост: средно / 6,5
Листа - селективност: средно / 6,5
Цвят на кожата: жълт / Y
Цвят на месото: светло жълт / 6
Повърхност на кожата: отлично / 8
Форма на клубена: овално кръгла / OR
Изравненост на формата на клубена: съвсем редовна / 6
Клубенообразуване: сравнително ниско / 5
Размер на клубените: сравнително голям / 7,5
Изравненост на размера: редовна / 7
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8
Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6
Метрибузин - преди поникване: леко до нечувствителен / 8
Метрибузин - след поникване: леко до нечувствителен / 8
Етилен: 5% до 15% повече клубени / 6
Тегло под вода: 318
Съдържание на сухо вещество: 17,7%
Вид на готвене: по-скоро твърд / AB
Обезцветяване след готвене: чувствителен / 5,5
Качество на пържените картофи: неподходящ / 4,5
Качество на хрупкавост: неподходящ / 4
ниво TGA: 4,8
Карвоново масло: 5% по-малко клубени / 4
S_Dormancy: средно / 6

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 10%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60 500 растения/ха)

35/55 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) не води до реакция на листата или намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за доставка направо от полето или за краткосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Листно свиване: леко податлив / 7

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко податлив / 7

Spraing: много податлив / 4

Късна мана - по листата: много податлив / 3

Късна мана - клубени: податливи / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Fusarium: слабо чувствителни / 6

Обикновена краста/струпяване: податливи / 5,5

Прашеста краста / струпяване: много податлив / 2

Черна петна: податливи / 5,5

Erwinia: податливи / 5

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9