

Twister.

Втори ранен сорт за конвенционално и биологично отглеждане с добър добив и устойчивост на късна зараза по листата и клубените.

- **Красив външен вид**
- **Добра съхраняемост**
- **Сравнително твърд за готвене**




**органични
продукти**
Органично



**търговия
на
дребно**
Пресен
пазар



традиционни
Традиционен



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: G.W. te Winkel

Кръстоска: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Селекционни права: 31-12-2048

Посадъчен материал: TW 08-1507

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: втора ранна / 7

Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV

Цвят на цветовете: светло лилав / LP

Брой на плодовете: над средната / 5,5

Листа - първоначално развитие: избързващ / 7

Листа - крайно развитие: доста добро / 7,5

Листа - твърдост: доста твърдо / 7

Листа - селективност: средно / 6,5

Цвят на кожата: жълт / Y

Цвят на месото: светло жълт / 6,5

Повърхност на кожата: добро / 7

Форма на клубена: кръгло овална / RO

Изравненост на формата на клубена: редовна / 7

Клубенообразуване: средно / 6

Размер на клубените: сравнително голям / 7

Изравненост на размера: съвсем редовна / 6,5

Период на покой: умерено дълъг / 7

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5

Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8

Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5

Повреди по реколтата: леко чувствителен / 7

Метрибузин - преди поникване: много чувствителен / 3

Метрибузин - след поникване: много чувствителен / 3

Бентазон / Bentazon: средно чувствителен / 6

Етилен: 5% по-малко клубени / 4

Тегло под вода: 345

Съдържание на сухо вещество: 19%

Вид на готвене: по-скоро твърд / AB

Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6,5

Обезцветяване на суровината: средно чувствителен / 6

Качество на пържените картофи: неподходящ / 5

Качество на хрупкавост: неподходящ / 4

ниво TGA: 5,63

Карвоново масло: 15% до 25% повече клубени / 7

S_Dormancy: умерено дълъг / 7

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 20%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Може да се засажда директно от хладилния склад, за предпочитане след кратък топлинен шок. Еднократното отстраняване на кълновете не е задължително.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60 500 растения/ха)

35/50 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване не използвайте метрибузин (Sencor), тъй като той предизвиква тежка реакция на листата и сериозно намаляване на добива.

Фунгициди

Въпреки устойчивостта на late blight/късна мана, останете нащрек за инфекции.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 6 °C. Подходящ за средно до дългосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко до нечувствителен / 8

Spraing: слабо чувствителни / 6

Късна мана - по листата: леко до слабо възприемчив / 9

Късна мана - клубени: леко до слабо възприемчив / 9

Say potato,
say Agrico.

Fusarium: слабо чувствителни / 6

Обикновена краста/струпяване: слабо чувствителни / 6

Прашеста краста / струпяване: податливи / 5

Черна петна: леко податлив / 7

Рак F1: умерено податлив / 8

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9