

Jolene.

Ранен сорт за основна култура с добра
кожица и подходящ за домашно
пържене.


- » Светложълт цвят на месото
- » Подходящ за различни ястия
- » Добро съдържание на сухо вещество



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



**традиционни
Традиционен**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.
Кръстоска: SAGITTA x AR 03-1491
Селекционни права: 31-12-2050
Посадъчен материал: AR 09-2556

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: ранна основна култура / 6
Светъл цвят на кълновете: червено / R
Цвят на цветовете: бял / W
Брой на плодовете: под средната / 7
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7,5
Листа - крайно развитие: добро / 8
Листа - твърдост: доста твърдо / 7,5
Листа - селективност: средно / 6
Цвят на кожата: жълт / Y
Цвят на месото: светло жълт / 6
Повърхност на кожата: добро / 7
Форма на клубена: овално продълговата / OL
Изравненост на формата на клубена: редовна / 7
Клубенообразуване: доста високо / 7
Размер на клубените: сравнително голям / 7,5
Изравненост на размера: редовна / 7
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: леко чувствителен / 7
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко чувствителен / 7
Растежни пукнатини: леко чувствителен / 7
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6
Метрибузин - преди поникване: средно чувствителен / 6,5
Метрибузин - след поникване: леко до нечувствителен / 8
Етилен: 15% до 25% повече клубени / 7
Тегло под вода: 389
Съдържание на сухо вещество: 21,1%
Вид на готвене: по-скоро брашнест / B
Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6,5
Обезцветяване на суровината: леко чувствителен / 7
Качество на пържените картофи: добър / 7
Качество на хрупкавост: неподходящ / 5
ниво TGA: 6,9
Карвоново масло: 15% до 25% повече клубени / 7
S_Dormancy: средно / 6
Степен на мутация: Този сорт може да се отличава с висока степен на мутация. Поради това използването на карвоново масло не се препоръчва. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 10%.

Третиране на семената

Може да се засажда директно от хладилния склад, за предпочитане след кратък топлинен шок. Отстраняването на кълните повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60 500 растения/ха)

35/55 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата и известно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирус - Yntn (клубени): леко до нечувствителен / 8

Spraing: слабо чувствителни / 6

Късна мана - по листата: много податлив / 4

Say potato,
say Agrico.

Късна мана - клубени: податливи / 5

Fusarium: слабо чувствителни / 6

Обикновена краста/струпяване: слабо чувствителни / 6

Прашеста краста / струпяване: леко податлив / 6,5

Черна петна: леко възприемчив / 7,5