

Manitou.

Сорт за основна култура с атрактивна червена кожа и висок добив.

- ▶ **Големи клубени**
- ▶ **Добра устойчивост на суша**
- ▶ **Многогранна устойчивост на картофени цистообразуващи нематоди.**



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



**традиционни
Традиционен**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Кръстоска: LAURA x MARANCA

Селекционни права: 31-12-2037

Посадъчен материал: MA 96-0419

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: основна култура / 5

Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV

Цвят на цветовете: лилав / P

Брой на плодовете: над средното / 5

Листа - първоначално развитие: избързващ / 7

Листа - крайно развитие: добро / 8

Листа - твърдост: доста твърдо / 7

Листа - селективност: лесно / 7

Цвят на кожата: червен / R

Цвят на месото: светло жълт / 6

Повърхност на кожата: добро / 7

Форма на клубена: продълговато овална / LO

Изравненост на формата на клубена: съвсем редовна / 6,5

Клубенообразуване: доста високо / 7

Размер на клубените: голям / 8

Изравненост на размера: редовна / 7

Период на покой: сравнително кратък / 5,5

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5

Черни петна (вътрешни натъртвания): леко чувствителен / 7,5

Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6

Повреди по реколтата: чувствителен / 5,5

Метрибузин - преди поникване: много чувствителен / 4

Метрибузин - след поникване: много чувствителен / 3,5

Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7

Етилен: 15% до 25% повече клубени / 7

Тегло под вода: 351

Съдържание на сухо вещество: 19,4%

Вид на готвене: по-скоро брашнест / B

Обезцветяване след готвене: леко чувствителен / 7

Качество на пържените картофи: под средното ниво / 5,5

Качество на хрупкавост: неподходящ / 4,5
ниво TGA: 3,4

Карвоново масло: 5% по-малко клубени / 4

S_Dormancy: сравнително кратък / 5,5

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 10%.

Третиране на семената

Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

35/55 mm: 30 cm (45 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване не използвайте метрибузин (Sencor), тъй като той предизвиква тежка реакция на листата и сериозно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне три седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 5 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: леко податлив / 6,5

Вирус - Yntn (клубени): леко податлив / 7

Spraing: леко податлив / 7

Късна мана - по листата: податливи / 5

Късна мана - клубени: слабо чувствителни / 6

Fusarium: леко податлив / 7

Обикновена краста/струпяване: слабо чувствителни / 6

Say potato,
say Agrico.

Пращеста краста / струпяване: слабо чувствителни / 6

Вирус - X: леко податлив / 7

Черна петна: леко податлив / 7

Erwinia: слабо чувствителни / 6

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9

Златна нематода Ro 2/3: устойчив / 9

R_Golden nematode Ro 5: устойчив на полеви условия* / 7*