

Agata.

Първи ранен, по-твърд сорт за готвене, с привлекателна гладка кожа и висок добив.

- » Еднаква форма и размер на клубените
- » Добра устойчивост на вируси
- » Добра толерантност към натъртване и увреждане



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



**традиционни
Традиционен**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Lantmännen Seed B.V.

Кръстоска: BM 72-0052 x SIRCO

Селекционни права: изтекли

Посадъчен материал: GE 77-0134

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: първа ранна / 8

Светъл цвят на клъновете: червено виолетово / RV

Цвят на цветовете: бял / W

Брой на плодовете: над средното / 5

Листа - първоначално развитие: бърз / 8

Листа - крайно развитие: добро / 8

Листа - твърдост: средно / 6

Листа - селективност: средно / 6,5

Цвят на кожата: жълт / Y

Цвят на месото: светло жълт / 6

Повърхност на кожата: отлично / 8

Форма на клубена: овална / O

Изравненост на формата на клубена: редовна / 7

Клубенообразуване: високо / 8

Размер на клубените: сравнително голям / 7

Изравненост на размера: съвсем редовна / 6

Период на покой: кратък / 4

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6

Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8

Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6

Повреди по реколтата: леко чувствителен / 7

Метрибузин - преди поникване: средно чувствителен / 6

Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6

Етилен: 5% по-малко до 5% повече клубени / 5

Тегло под вода: 316

Съдържание на сухо вещество: 17,6%

Вид на готвене: по-скоро твърд / AB

Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6

Обезцветяване на суровината: средно чувствителен / 6,5

Качество на пържените картофи: неподходящ / 4

Качество на хрупкавост: неподходящ / 4

ниво TGA: 8

Карвоново масло: 5% по-малко до 5% повече клубени / 5

S_Dormancy: кратък / 4

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 20%. За предпочитане е да се прилага разделено на части, като второто третиране се извършва скоро след клубенообразуването.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67 000 растения/ха)

35/50 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата и известно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за дългосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Листно свиване: слабо чувствителни / 6

Вирус - Yn: леко податлив / 7

Вирус - Yntn (клубени): леко до нечувствителен / 8

Spraing: леко податлив / 6,5

Късна мана - по листата: податливи / 5

Късна мана - клубени: слабо чувствителни / 6

Fusarium: податливи / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Обикновена краста/струпяване: податливи / 5

Прашеста краста / струпяване: слабо чувствителни / 6

Вирус - X: податливи / 5

Черна петна: леко податлив / 6,5

Erwinia: податливи / 5

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9