


Paradiso.



традиционни
Традиционен

Ранна основна култура, големи растящи клубени с отличен добив за традиционния пазар.

- » Големите клубени
- » Красив външен вид
- » Добра устойчивост на натъртване



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: M. Pot & M. Klaver
Кръстоска: RODEO x VALOR
Селекционни права: 31-12-2048
Посадъчен материал: PK 06-0108

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: ранна основна култура / 5,5
Светъл цвят на кълновете: червено / R
Цвят на цветовете: лилав / P
Брой на плодовете: под средната / 6,5
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7,5
Листа - крайно развитие: доста добро / 7,5
Листа - твърдост: доста твърдо / 7
Листа - селективност: лесно / 7
Цвят на кожицата: жълт / Y
Цвят на месото: светло жълт / 6
Повърхност на кожата: добро / 7
Форма на клубена: овално продълговата / OL
Изравненост на формата на клубена: съвсем редовна / 6,5
Клубенообразуване: средно / 6
Размер на клубените: голям / 8
Изравненост на размера: съвсем редовна / 6,5
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: леко чувствителен / 7
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко чувствителен / 7,5
Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6,5
Метрибузин - преди поникване: леко до нечувствителен / 8
Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6,5
Бентазон / Bentazon: средно чувствителен / 6,5
Етилен: 5% до 15% повече клубени / 6
Тегло под вода: 329
Съдържание на сухо вещество: 18,2%
Вид на готвене: по-скоро брашнест / B
Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6,5
Качество на пържените картофи: неподходящ / 4,5
Качество на хрупкавост: неподходящ / 4
ниво TGA: 4,8
Карвоново масло: 5% по-малко клубени / 4
S_Dormancy: средно / 6

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет - 20%. За предпочитане е да се прилага разделено на части, като второто третиране се извършва скоро след клубенообразуването.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Отстраняването на кълновете може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58 000 растения/ха)

35/55 mm: 33 cm (40 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) не води до реакция на листата или намаляване на добива.

Фунгициди

Препоръчва се превантивно пръскане срещу late blight/късна мана

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за средносрочно съхранение.



Устойчивост

Вирус - Yn: слабо чувствителни / 6

Вирус - Yntn (клубени): леко възприемчив / 7,5

Spraing: много податлив / 4

Късна мана - по листата: податливи / 5,5

Късна мана - клубени: леко податлив / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Fusarium: податливи / 5

Обикновена краста/струпяване: податливи / 5,5

Прашеста краста / струпяване: леко възприемчив / 7,5

Черна петна: податливи / 5,5

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9