

Picasso.



традиционни
Традиционен

Сорт за основни култури, с жълта
кожица, открояващи се червени очи,
добра устойчивост на обикновена
краста и подходящ за дългосрочно
съхранение.

- » **Висока производителност**
- » **Добра устойчивост на суша**
- » **Добра устойчивост на натъртване и повреждане**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Duoplant V.O.F.

Кръстоска: CARA x AUSONIA

Селекционни права: изтекли

Посадъчен материал: HB 81-0036

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: основна култура / 5

Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV

Цвят на цветовете: бял / W

Брой на плодовете: много висока / 4

Листа - първоначално развитие: среден / 6,5

Листа - крайно развитие: добро / 8

Листа - твърдост: доста твърдо / 7,5

Листа - селективност: лесно / 7

Цвят на кожата: жълт с червени очи / Y/R

Цвят на месото: светло жълт / 6

Повърхност на кожата: средно / 6

Форма на клубена: овална / O

Изравненост на формата на клубена: съвсем редовна / 6

Клубенообразуване: средно / 6

Размер на клубените: голям / 8

Изравненост на размера: редовна / 7

Период на покой: дълъг / 8

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6,5

Черни петна (вътрешни натъртвания): леко чувствителен / 7

Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6

Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6,5

Метрибузин - преди поникване: средно чувствителен / 6

Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6

Етилен: 5% по-малко до 5% повече клубени / 5

Тегло под вода: 381

Съдържание на сухо вещество: 20,8%

Вид на готвене: по-скоро брашнест / B

Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6,5

Качество на пържените картофи: неподходящ / 5

Качество на хрупкавост: неподходящ / 4

ниво TGA: 1,9

Карвоново масло: 15% до 25% повече клубени / 7

S_Dormancy: дълъг / 8

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет + 5%.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет

Третиране на семената

Правилното предварително покълване след откъсване на горния кълн може да даде положителен резултат за залагането на клубените. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50 000 растения/ха)

35/55 mm: 33 cm (40 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата и известно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за дългосрочно съхранение.



Устойчивост

Вирс - Листно свиване: податливи / 5

Вирс - Yn: леко до нечувствителен / 8

Вирс - Yntn (клубени): податливи / 5

Spraing: податливи / 5

Късна мана - по листата: податливи / 5

Късна мана - клубени: леко податлив / 7

Fusarium: леко податлив / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Обикновена краста/струпяване: леко податлив / 7

Прашеста краста / струпяване: податливи / 5

Вирс - X: леко до слабо възприемчив / 9

Erwinia: податливи / 5

Рак F1: устойчив / 10

Рак F6: доста податлив / 5

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9