

Ranomi.

Ранен сорт с относително добра устойчивост на обикновена краста и ранен добър добив.


- » Хубаво покритие на кожата
- » Големи клубени
- » Сравнително твърд при готвене



**търговия
на
дребно
Пресен
пазар**



**традиционни
Традиционен**



characteristics

Основни характеристики

Селекционер: Agrico Research B.V.
Кръстоска: AR 93-033-79 x AR 95-0319
Селекционни права: 31-12-2044
Посадъчен материал: AR 03-0221

Характеристики на растенията и клубените

Зрялост: ранна култура / 7,5
Светъл цвят на кълновете: червено виолетово / RV
Цвят на цветовете: бял / W
Брой на плодовете: средно / 6
Листа - първоначално развитие: избързващ / 7,5
Листа - крайно развитие: средно / 7
Листа - твърдост: средно / 6,5
Листа - селективност: средно / 6
Цвят на кожата: жълт / Y
Цвят на месото: светло жълт / 6,5
Повърхност на кожата: добро / 7
Форма на клубена: овално продълговата / OL
Изравненост на формата на клубена: редовна / 7
Клубенообразуване: средно / 6
Размер на клубените: сравнително голям / 7
Изравненост на размера: редовна / 7
Период на покой: средно / 6

Чувствителност и качество

Вторичен растеж: средно чувствителен / 6
Черни петна (вътрешни натъртвания): леко до нечувствителен / 8
Растежни пукнатини: средно чувствителен / 6,5
Повреди по реколтата: средно чувствителен / 6
Метрибузин - преди поникване: чувствителен / 5
Метрибузин - след поникване: средно чувствителен / 6
Бентазон / Bentazon: леко чувствителен / 7
Етилен: 5% до 15% повече клубени / 6
Тегло под вода: 322
Съдържание на сухо вещество: 17,9%
Вид на готвене: по-скоро твърд / AB
Обезцветяване след готвене: средно чувствителен / 6
Качество на пържените картофи: над средното ниво / 6,5
Качество на хрупкавост: неподходящ / 5
ниво TGA: 4,08
Карвоново масло: 15% до 25% повече клубени / 7
S_Dormancy: средно / 6

How to grow

Наторяване и третиране на семената ¹

Азот: стандартен съвет За предпочитане е да се прилага разделено на части, като второто третиране се извършва скоро след клубенообразуването.

Фосфат: стандартен съвет

Калий: стандартен съвет + 10%.

Третиране на семената

Може да се засажда директно от хладилния склад, за предпочитане след кратък топлинен шок. Отстраняването на кълновете повече от веднъж може да има отрицателно въздействие върху добива, редовността на посева и размера на клубените.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54 000 растения/ха)

35/55 mm: 30 cm (45 000 растения/ха)

¹ Level of fertilization is based on soil analysis.

Плевели

След поникване стандартната употреба на метрибузин (Sencor) може да доведе до известна реакция на листата и известно намаляване на добива.

Фунгициди

Необходим е строг график за превантивно пръскане срещу late blight/късна мана.

Прибиране

Предвид чувствителността му към черни петна и/или повреди по реколтата, изчакайте поне две седмици след обезлистването, преди да приберете реколтата.

Температура на съхранение - Време на съхранение

Предпочитаната температура на съхранение е 4 °C. Подходящ за доставка направо от полето или за краткосрочно съхранение.



Say potato,
say Agrico.

Устойчивост

Вирус - Yn: податливи / 5,5

Вирус - Yntn (клубени): слабо чувствителни / 6

Spraing: леко податливи / 6,5

Късна мана - по листата: много податливи / 4

Късна мана - клубени: слабо чувствителни / 6

Fusarium: податливи / 5

Обикновена краста/струпяване: леко податливи / 6,5

Прашеста краста / струпяване: много податливи / 4,5

Вирус - X: податливи / 5,5

Черна петна: леко податливи / 7

Рак F1: устойчив / 10

Златна нематода Ro 1/4: устойчив / 9