

Sidney.



Prerada
Pomfrit

Image:

Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.

Križanje: LADY ANNA x AR 05-3392

Sadnica: AR 12-1680

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 6

Svijetla boja izdanaka: - / -

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: - / -

Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7

Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5

Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7,5

Boja kože: žuta / Y

Boja mesa: bijela / 4,5

Završna obrada kože: prilično slab / 5

Oblik gomolja: dugi ovalni / LO

Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5

Teberizacija: prosječna / 6

Veličina gomolja: prilično veliko / 7,5

Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5

Dormantnost: prosječno / 6,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5

Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7,5

Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6

Šteta u žetvi: malo osjetljiv / 7

Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5

Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5

Bentazon: - / -

Etilen: od 5% manje gomolja do 5% više gomolja / 5

Podvodna težina: 396

Sadržaj suhe tvari: 21,5%

Vrsta kuhanja: prilično brašnast / B

Siva promjena boje (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7

Sirova promjena boje: malo osjetljiv / 7,5

Kvaliteta prženja: iznad prosjeka / 6,5

Raspodjela suhe tvari: izvrsno / 8,5

Kvaliteta hrskavosti: - / -

Razina TGA: 4,3


agricopotatoes.ba

Kako uzgojiti

Gnojidba i tretiranje sjemena ¹

Dušik: standardni savjet.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 10%.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka. Isklijavanje više puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 26 cm (51.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 37 cm (36.000 plants/ha)

¹ Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja nemojte koristiti metribuzin (Sencor), jer uzrokuje jaku reakciju lišća i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za srednje skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7,5

Prskanje: malo do nimalo osjetljivo / 8

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - gomolj: malo do nimalo osjetljivo / 8

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 6

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: jako osjetljivo* / 1*

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: osjetljiv / 4

Bijela nematoda Pa 2: otporan na polje / 8

Bijela nematoda Pa 3: umjereno osjetljiv / 6