PREPORUKA ZA UZGOJ

Sidney.

Rana sorta za glavni usjev, krem boje mesa, namijenjena preradi i proizvodnji visokokvalitetnog pomfrita.

Prerada
Pomfrit

- **Krupni gomolji**
- **Dobra otpornost na virusne bolesti**
- **Ujednačena raspodjela suhe tvari, što je čini pogodnom za QSR segment (Quick Service Restaurants)**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: LADY ANNA x AR 05-3392
Sadnica: AR 12-1680

Karakteristike biljke i gomolja

Zrelost: rani glavni usjev / 6
Svijetla boja izdanaka: - / -
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: - / -
Lišće - početni razvoj: prilično brz / 7
Lišće - konačni razvoj: prilično dobro / 7,5
Lišće čvrstoća: prilično čvrst / 7,5
Boja kože: žuta / Y
Boja mesa: bijela / 4,5
Završna obrada kože: prilično slab / 5
Oblik gomolja: dugi ovalni / LO
Pravilnost oblika gomolja: prilično pravilan / 6,5
Teberizacija: prosječna / 6
Veličina gomolja: prilično veliko / 7,5
Pravilnost veličine: prilično pravilan / 6,5
Dormantnost: prosječno / 6,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: dosta osjetljiv / 6,5
Crna mrlja (unutarnja modrica): malo osjetljiv / 7,5
Pukotine rasta: dosta osjetljiv / 6
Šteta u žetvi: malo osjetljiv / 7
Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5
Metribuzin - prije nicanja: prilično osjetljivo / 6,5
Bentazon: - / -
Etilen: od 5% manje gomolja do 5% više gomolja / 5
Podvodna težina: 396
Sadržaj suhe tvari: 21,5%
Vrsta kuhanja: prilično brašnast / B
Siva promjena boje (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7
Sirova promjena boje: malo osjetljiv / 7,5
Kvaliteta prženja: iznad prosjeka / 6,5
Raspodjela suhe tvari: izvrsno / 8,5
Kvaliteta hrskavosti: - / -
Razina TGA: 4,3

AGRICO

Ni u kojem slučaju Agrico neće biti odgovoran za štete nastale ili povezane s informacijama sadržanim u ovom opisu.

SJEMENARNA

PREPORUKA ZA UZGOJ

Preporuke za uzgoj

agricopotatoes.ba

Gnojidba i tretiranje sjemena [1]

Dušik: standardni savjet.

Fosfat: standardni savjet.

Kalij: standardni savjet + 10%.

Tretiranje sjemena

Može se saditi izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka.Isklijavanje više puta može imati negativan učinak na pravilnost prinosa i veličine.

Razmak sadnje

28/35 mm: 26 cm (51.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

50/55 mm: 37 cm (36.000 plants/ha)

[1] Razina gnojidbe temelji se na analizi tla.

Korov

Nakon nicanja nemojte koristit metribuzin (Sencor), jer uzrokuje jaku reakciju lišća i ozbiljno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potreban je strogi raspored preventivnog prskanja protiv plamenjača.

Prihod

Zbog svoje ocjene osjetljivosti na crnu pjegavost i/ili oštećenje žetve, pričekajte najmanje tri tjedna nakon uništavanja stabljike prije žetve.

Temperatura skladištenja - Vrijeme skladištenja

Željena temperatura skladištenja 5 °C. Za potrebe obrade, ne skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za srednje skladištenje.



Say potato, say Agrico.

Otpornost

Virus - Smotanje lišća: - / -

Virus - Yn: malo do nimalo osjetljivo / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo osjetljivo / 7,5

Prskanje: malo do nimalo osjetljivo / 8

Kasna mrlja - lišće: vrlo osjetljivo / 4

Kasna mrlja - gomolj: malo do nimalo osjetljivo / 8

Fusarium: malo osjetljivo / 6

Obična krasta: osjetljivo / 5,5

Krasta u prahu: malo osjetljivo / 6

Crna točka: osjetljivo / 5,5

Bolest bradavica F1: jako osjetljivo* / 1*

Bolest bradavica F6: - / -

Bolest bradavica F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: osjetljiv / 4

Bijela nematoda Pa 2: otporan na polje / 8

Bijela nematoda Pa 3: umjereno osjetljiv / 6

AGRICO

Sjemenarna • Fra Didaka Buntića 160 A • Široki Brijeg • BiH +387 39 700 000

info@sjemenarna.com www.agricopotatoes.ba

SJEMENARNA